

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства
здравоохранения Украины
26.02.14 № 149
Регистрационное удостоверение
№ *UA/8864/04/01*

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного средства

БЕРЕЗЫ ПОЧКИ
(*BETULAE GEMMAE*)

Состав лекарственного средства:

действующее вещество:

1 пакет содержит березы почек (*Betulae gemmae*) - 10 г, 50 г.

Лекарственная форма. Почки.

Почки удлинненно-конические, заостренные или притупленные, часто клейкие. Чешуйки расположены черепицеобразно, плотно прижаты по краям, слегка реснитчатые (нижние короче, чем верхние, иногда с чуть отстающими кончиками), длина почек 3-7 мм, ширина 1,5-3 мм. Цвет почек коричневый, у основания иногда зеленоватый. Запах бальзамический, приятный. Вкус слегка вяжущий, смолистый.

Название и местонахождение производителя.

ООО «Тернофарм».

Украина, 46010, м. Тернополь, ул. Фабричная, 4.

Фармакотерапевтическая группа.

Нетиазидные диуретики с умеренно выраженной активностью. АТС C03B X.

Березовые почки содержат эфирное масло, сапонины, флавоноиды (апигенин, изорамнетин), дубильные вещества, смолы, аскорбиновую и никотиновую кислоты, каротин и гиперозид. Препарат из березовых почек оказывает мочегонное, желчегонное, спазмолитическое, противовоспалительное, антисептическое, ранозаживляющее, отхаркивающее, антивирусное и противопаразитарное действие.

Показания к применению.

Хронические воспалительные заболевания почек и мочевого пузыря; мочекаменная болезнь, отеки сердечного происхождения; заболевания печени и желчевыводящих путей с нарушением оттока желчи; ларингиты, бронхиты, трахеиты.

Противопоказания.

Почечная недостаточность, острые воспалительные заболевания почек, гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата, наличие в анамнезисе кровотечений из органов малого таза; анемия; эпилепсия.

Надлежащие меры безопасности при применении.

Перед началом лечения следует проконсультироваться с врачом. При появлении дизурических явлений, лихорадки, спазмов или крови в моче следует обратиться к врачу.

Особые предостережения.**Применение в период беременности или кормления грудью.**

Безопасность и клиническая эффективность препарата в период беременности или кормления грудью не изучалась.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.

Не влияет.

Дети.

Не назначать детям в возрасте до 12 лет.

Способ применения и дозы.

1 столовую ложку почек поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл кипяченой воды, закрыть крышкой и настоять на кипящей водяной бане 15 минут. Охладить при комнатной температуре 45 минут, процедить, остаток отжать до процеженного настоя. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл. Взрослым принимать в теплом виде по $\frac{1}{3}$ стакана 2-3 раза в день за 15-20 минут до еды. Дети 12-14 лет – по $\frac{1}{4}$ стакана, от 14 лет – по $\frac{1}{2}$ стакана 2-3 раза в день за 15-20 минут до еды. Перед употреблением настой рекомендуется взбалтывать. Продолжительность лечения определяет врач индивидуально.

Передозировка.

Сообщений о передозировке препарата не поступало.

Побочные эффекты.

Диарея. Возможны проявления раздражающего действия настоя на ткань почек; аллергические реакции, включая зуд, сыпь, аллергический ринит, крапивницу, гиперемию и отек кожи. При появлении побочных реакций следует прекратить прием препарата и обязательно обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.
Неизвестно.**Срок годности.**

2 года.

Условия хранения.

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Приготовленный настой хранить при температуре не выше 15 °С не более 2 суток.
Хранить в недоступном для детей месте!

Упаковка.

По 10 г или 50 г в пачке с внутренним пакетом.

Категория отпуска.

Без рецепта.

Дата последнего просмотра.

Утверждено з матеріалами
реєстраційного допис та достовірно
відомими даними щодо застосування
лікарського засобу