

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

ИНГАЛИПТ-Н

Регистрационный номер:

П N014404/01-300311

Торговое название препарата: Ингалипт-Н

Лекарственная форма: аэрозоль для местного применения дозированные

Состав:**на один баллон:***Активные вещества:* стрептоцида растворимого – 0,750 г, сульфатиазола натрия – 0,750 г.*Вспомогательные вещества:* тимола - 0,015 г, масла эвкалиптового - 0,015 г, масла мяты перечной - 0,015 г, спирта этилового (этанола) 96 % - 1,800 г, сахара-рафинада (сахарозы) - 1,500 г, глицерина (глицерола) - 2,100 г, твина-80 (полисорбата-80) - 0,900 г, воды очищенной - до 30,00 г.**Описание**

Прозрачная жидкость от светло-желтого до темно-желтого цвета с характерным запахом.

Фармакологическая группа

противомикробное комбинированное средство.

Код АТХ: R02AA20

Фармакологическое действие

Комбинированный препарат для местного применения при инфекционно-воспалительных заболеваниях полости рта и горла. Входящие в состав препарата растворимые сульфаниламиды оказывают противомикробное действие (в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, вызывающих заболевания полости рта). Тимол, эвкалиптовое масло и мяты перечной масло оказывают противогрибковый (в отношении грибов рода *Candida*), противомикробный, противовоспалительный и легкий обезболивающий эффект.

Показания к применению

Острые и хронические инфекционно-воспалительные заболевания полости рта, гортани и носоглотки: ларингит, фарингит, тонзиллит, афтозный и язвенный стоматит.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость сульфаниламидов, эфирных масел или других компонентов препарата, детский возраст.

С осторожностью беременность, кормление грудью.

Беременность и кормление грудью

Применение препарата в периоды беременности и лактации возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

Способ применения и дозы

Местно. Перед орошением рот и глотку прополаскивают теплой, кипяченой водой. С пораженных участков полости рта (язвы, эрозии) с помощью

тампонов удаляют некротический налет. Снять с баллона предохранительный колпачок, на стержень клапана надеть прилагаемый распылитель. Свободный конец распылителя ввести в рот и нажать на головку баллона, в течение 1-2 сек. При заболеваниях полости рта препарат удерживают в полости рта 5-7 мин. Во избежание снижения эффективности препарата рекомендуется воздерживаться от приема пищи и жидкости в течение 30 мин после орошения. Орошение производят 3-4 раза в сутки. Курс лечения не более 7 дней.

Побочное действие

Возможно кратковременное ощущение «жжения» или «першения», аллергические реакции. В случае проявления необычных реакций следует посоветоваться с врачом о целесообразности дальнейшего применения препарата.

Передозировка

Случаи передозировки не описаны.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Вследствие низкой системной абсорбции препарата, при применении в соответствии с инструкцией по применению, взаимодействие с другими лекарственными средствами маловероятно, что позволяет применять одновременно другие препараты без опасности их взаимодействия с компонентами препарата.

Особые указания

Во избежание закупорки отверстия распылителя по окончании манипуляции его необходимо продуть или поместить в стакан с чистой водой.

При использовании баллон следует держать только вертикально!

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Ингалипт-Н не влияет на способность к вождению автотранспорта и выполнению работ, требующих повышенной скорости психомоторных реакций.

Форма выпуска

По 30 г в баллоны аэрозольные моноблочные алюминиевые с внутренним фенольно-эпоксидным защитным покрытием с механическим насосом дозирующего действия снабженными насадками горловыми с предохранительными колпачками. Каждый баллон с насадкой горловой, предохранительным колпачком и инструкцией по применению помещают в пачку картонную.

Условия хранения

Хранить при температуре от 3 °С до 35 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

1 год. Не использовать после истечения срока годности.

Условия отпуска

Без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения

ООО «Микрофарм»

Производитель

ООО «Микрофарм»

Юридический адрес: 61013, Украина, г. Харьков, ул. Шевченко, 20.

Адрес для переписки (фактический адрес, в том числе для приема претензий): 61013, Украина, г. Харьков, ул. Шевченко, 20
Тел./факс: (+38-057) 71-40-371, (+38-057) 71-42-080

Директор ООО «Микрофарм»



С.Б.Бусыгин

