

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Наказ Міністерства охорони**  
**здоров'я України**

*22.03.13* № *230*

**Реєстраційне посвідчення**

№ *22A/8243/01/01*

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування препарату**

**ГЛОДУ НАСТОЙКА**

**Склад лікарського засобу:**

*діючі речовини:* 1 флакон містить настойки плодів глоду (*Crataegi fructus*) (1:10)  
(екстрагент – етанол 70 %) – 25 мл або 100 мл;  
*допоміжні речовини,* крім екстрагенту, відсутні.

**Лікарська форма.** Настойка.

Рідина червонувато-коричневого кольору. У процесі зберігання можливе випадання осаду.

**Назва і місцезнаходження виробника.**

ТОВ «Тернофарм»

Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4.

Тел./факс: (0352) 521-444, <http://www.ternopharm.com.ua>.

**Фармакотерапевтична група.** Засоби, що застосовуються у кардіології.

Код АТС C01E B04.

Біологічно активні речовини, що містяться у плодах глоду (флавоноїди, холін, ацетилхолін, дубильні речовини, фітостерини, тритерпенові кислоти) посилюють кровообіг у коронарних судинах та судинах головного мозку, підвищують чутливість міокарда до серцевих глікозидів і зменшують його збудливість, що призводить до певного посилення скорочень серцевого м'яза.

Препарат добре всмоктується при застосуванні внутрішньо. Ефект настає через 30 хв – 1 годину.

**Показання для застосування.**

Функціональні розлади діяльності серцево-судинної системи (нейроциркуляторні дистонії), а також як допоміжний лікарський засіб при легких формах порушень серцевого ритму (миготлива аритмія, пароксизмальна тахікардія).

**Протипоказання.**

Індивідуальна непереносимість компонентів препарату. Виражена артеріальна гіпотензія і брадикардія.

**Належні заходи безпеки при застосуванні.**

Препарат не рекомендується застосовувати під час їди, щоб уникнути взаємодії з компонентами їжі.

### **Особливі застереження.**

#### ***Застосування у період вагітності або годування груддю.***

Оскільки до складу препарату входить етанол, настойку не рекомендується застосовувати жінкам у період вагітності або годування груддю.

#### ***Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.***

Слід утримуватись від керування автотранспортом або роботи з іншими механізмами.

#### ***Діти.***

Оскільки до складу препарату входить етанол, настойку не рекомендується застосовувати дітям віком до 12 років.

### **Спосіб застосування та дози.**

Приймати внутрішньо до їди.

Дорослим рекомендується приймати по 20 крапель настойки, дітям віком від 12 років – із розрахунку 1 крапля на 1 рік життя 3 рази на день до досягнення стабільного лікувального ефекту (нормалізація артеріального тиску, зменшення серцебиття).

### **Передозування.**

При значному перевищенні дози можливе виникнення сонливості, брадикардія, зниження артеріального тиску, які вимагають припинення прийому препарату і проведення симптоматичної терапії.

### **Побічні ефекти.**

Рідко спостерігаються сонливість, значне уповільнення серцевого тиску, алергічні реакції (у т. ч. гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри).

### **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Препарат може посилювати дію серцевих глікозидів, снодійних, седативних, гіпотензивних засобів. Прийом із солями алкалоїдів не рекомендується у зв'язку з можливістю утворення негативних комплексів. Не слід застосовувати препарат разом із цизапридом.

### **Термін придатності.**

4 роки.

### **Умови зберігання.**

Зберігати у захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

### **Упаковка.**

По 25 мл у флаконах-крапельницях, по 100 мл у флаконах скляних.

### **Категорія відпуску.**

Без рецепта.

### **Дата останнього перегляду.**

Узгоджено з матеріалами  
реєстраційного доосьє та достовірно  
відомими даними щодо застосування  
лікарського засобу