



ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ИНГАЛИПТ - Н

Торговое название препарата: Ингалипт – Н

Действующие вещества (МНН): стрептоцид растворимый, сульфатиазол натрия гексагидрат

Лекарственная форма: спрей для ротовой полости.

Состав:

1 баллон содержит:

активные вещества: стрептоцида растворимого 0,75 г; сульфатиазола натрия гексагидрата 0,75 г;

вспомогательные вещества: тимол, масло мяты перечной, масло эвкалиптовое, глицерин, этанол 96%, полисорбат 80, сахароза, вода очищенная.

Описание: прозрачная жидкость от светло-желтого до темно-желтого цвета со специфическим запахом.

Фармакотерапевтическая группа: средство для лечения заболеваний ЛОР-органов.

Код АТХ: R02AA20.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Ингалипт-Н оказывает антибактериальное и противовоспалительное действие, а также охлаждающее и отвлекающее действие. Соединение указанных фармакологических свойств обеспечивает комплексную патогенетическую терапию воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей и слизистой оболочки ротовой полости. Ингалипт-Н не оказывает ulcerогенное и общетоксическое действие на организм.

Фармакокинетика

Ингалипт-Н предназначен для местного применения и создает терапевтическую концентрацию главным образом в очаге воспаления. В системный кровоток частично всасываются сульфаниламиды (стрептоцид растворимый и сульфатиазол натрия), которые обратно связываются белками крови: стрептоцид растворимый на 12-14%, сульфатиазол натрия – на 55%. В процессе биотрансформации образуются ацетилированные формы сульфаниламидов, в виде которых они выводятся почками. Период полувыведения стрептоцида растворимого составляет 10 часов, сульфатиазола натрия – 1,2 часа.

Показания к применению

Местное лечение инфекционно-воспалительных заболеваний ЛОР-органов и слизистой оболочки полости рта (тонзиллит, фарингит, ларингит, афтозный и язвенный стоматиты).

Способ применения и дозы

Применять взрослым и детям в возрасте от 3 лет местно на слизистые оболочки полости рта и носоглотки путем орошения.

Взрослым орошение проводить 3-4 раза в сутки.

Детям старше 3 лет орошения проводить 1-2 раза в сутки, если нет особых указаний врача. Длительность применения препарата зависит от течения заболевания и обычно составляет 3-10 суток.

Частота и длительность применения устанавливаются индивидуально врачом и зависят от тяжести заболевания!

Правила пользования баллоном.

1. Снять защитный колпачок с баллона.
2. На баллон надеть насадку горловую (распылитель), которая прилагается, предварительно убедившись в ее чистоте.
3. Несколько раз встряхнуть баллон и провести не более 7 нажатий на насадку до появления дисперсной струи. Разрешается при отсутствии струи повторить действия еще раз.
4. Свободный край распылителя ввести в полость рта и, удерживая баллон вертикально, нажать на головку распылителя. За один сеанс орошения совершается 2-3 распыления Ингалипта-Н.
5. Закончив орошение, снять распылитель со штока баллона и закрыть баллон защитным колпачком, чтобы предотвратить его загрязнение.
6. Распылитель следует держать в чистоте, после применения препарата промыть его теплой водой с дальнейшим высушиванием в теплом месте.

Побочные действия

Аллергические реакции, в том числе высыпания на коже, зуд, отек в местах контакта, ангионевротический отек, бронхоспазм, крапивница.

Препарат, как правило, переносится хорошо, но в отдельных случаях возможны:

Со стороны иммунной системы: аллергические реакции, включая ангионевротический отек, бронхоспазм.

Со стороны кожи: высыпания, зуд, крапивница, отек в месте контакта.

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, местные эффекты (изжога во рту, комок в горле или першение).

Другие: общая слабость, затрудненное дыхание.

В случае выявления каких-либо нежелательных явлений или необычных реакций следует посоветоваться с врачом по поводу дальнейшего применения препарата.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, наличие в анамнезе тяжелых токсико-аллергических реакций на сульфаниламиды.

Лекарственные взаимодействия

Если Вы принимаете какие-либо другие лекарственные средства, обязательно проконсультируйтесь с врачом по возможности дальнейшего применения препарата!

Возможно ослабление противомикробного действия препарата при одновременном применении с препаратами – производными парааминобензойной кислоты (новокаин, анестезин, дикаин).

Особые указания

Перед применением препарата лицам со склонностью к аллергии следует проконсультироваться с врачом!

Без консультации с врачом не применяйте препарат свыше установленного срока!

Обязательно сообщите врачу про предыдущую реакцию на прием препаратов этой группы.

Не допускать попадание препарата в глаза.

Перед первым применением сделать не больше 7 нажатий на насадку до появления дисперсной струи. Разрешается при отсутствии струи повторить действия еще раз.

Перед применением препарата рекомендуется прополоскать полость рта тёплой кипячёной водой. С повреждённых участков ротовой полости (язвы, эрозии) с помощью стерильных тампонов удалить некротический налет.

После орошения полости рта препаратом следует воздерживаться от приёмов пищи в течение 15-30 минут.

После применения препарата снять горловой распылитель со штока и промыть его теплой водой. Закрыть баллон защитным колпачком, чтобы предупредить его загрязнение.

При применении препарата детям следует учесть, что однократная доза препарата, которая распыляется за 1-2 распыления, содержит 0,0076-0,0152 мл этанола (96%), что составляет на однократный прием: для детей в возрасте 3-5 лет (масса тела 15-21 кг) 0,0004-0,0013 мл/кг, возрастом 6-12 лет (масса тела 21-38 кг) 0,0002-0,0007 мл/кг.

Поскольку данное лекарственное средство содержит сахарозу, пациентам с редкой наследственной непереносимостью фруктозы, синдромом глюкозно-галактозной мальабсорбции или недостаточностью сахарозы-изомальтозы не следует применять этот препарат.

Применение в период беременности или кормления грудью

Применение препарата в период беременности или кормления грудью возможно под контролем врача, взвесив соотношение польза/риск и строго придерживаясь режима дозирования препарата.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и механизмами, но водителям автотранспорта следует учесть возможное искажение результатов исследования на алкоголь.

Дети

Препарат не применять детям до 3 лет. С осторожностью применять детям от 3 лет в связи с возможностью развития рефлекторного бронхоспазма, обусловленного содержанием эфирных масел эвкалипта и мяты перечной. Лечение детей следует проводить под присмотром врача.

Передозировка

Случаи передозировки не описаны. Возможно усиление побочных эффектов.

Лечение: отмена препарата, полоскание полости рта теплой кипяченой водой. Терапия симптоматическая.

Форма выпуска

По 30 г в баллоне алюминиевом с распылителем и защитным колпачком.

Каждый баллон вместе с инструкцией по медицинскому применению в картонной коробке.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте, вдали от огня.

Срок годности

2 года.

Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель

ООО «Микрофарм».

Украина, 61013, г. Харьков, ул. Шевченко, 20.

Наименование и адрес организации принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан

ООО «PHARMALINE IMPEXTRADE»

Республика Узбекистан, г. Ташкент, Чиланзар б, ул. Чупон-Ота, 17/1.