

7

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
13.07.2018 № *1313*
Реєстраційне посвідчення
№ UA/1090/02/01

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу

СТРЕПТОЦИДОВА МАЗЬ 10 %

Склад:

діюча речовина: 1 г мазі містить сульфаніламідну 0,1 г;
допоміжна речовина: парафін білий м'який.

Лікарська форма. Мазь 10 %.

Основні фізико-хімічні властивості: мазь білого або світло-жовтого кольору. За зовнішнім виглядом мазь повинна бути однорідною.

Фармакотерапевтична група. Хіміотерапевтичні засоби для місцевого застосування.
Сульфаніламідні.
Код АТХ D06B A05.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Препарат виявляє антимікробний вплив на стрептококи та інші мікроорганізми. Стрептоцид порушує процес асиміляції мікробною клітиною факторів її росту – фолієвої, дигідрофолієвої кислот та інших сполук, які мають у своєму складі пара-амінобензойну кислоту (ПАБК). Завдяки схожості хімічної структури ПАБК і сульфаніламідну останній як конкурентний антагоніст кислоти включається у метаболізм мікроорганізмів і порушує його.

Фармакокінетика. Не вивчалась.

Клінічні характеристики.

Показання.

Виразки, опіки, тріщини, рани, піодермії, бешпихове запалення та інші патологічні гнійно-запальні процеси шкіри, які супроводжуються присутністю мікроорганізмів або спричинені останніми.

Протипоказання.

Препарат протипоказаний при підвищеній чутливості до сульфаніламідних засобів чи до будь-якого компонента препарату, нирковій недостатності, гострій порфірії.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Під час застосування «Стрептоцидової мазі 10 %» небажано приймати такі препарати, як дигітоксин, кислоту хлористоводневу, кофеїн, мезатон, фенобарбітал, адреналіну гідрохлорид, новокаїн.

Новокаїн, який містить залишок параамінобензойної кислоти, знижує ефективність препарату, якщо ці лікарські засоби застосовувалися один за одним.



Особливості застосування.

При появі алергічної реакції у місці нанесення мазі слід припинити застосування препарату. Передчасне припинення лікування препаратом може спричинити розвиток стійких до сульфаніламідів мікроорганізмів.

Застосування у період вагітності або годування груддю.
Препарат протипоказаний.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.
Не впливає.

Спосіб застосування та дози.

«Стрептоцидову мазь 10 %» наносити тонким шаром на уражену ділянку, у тому числі під марлеву пов'язку.

Кратність та тривалість застосування залежить від тяжкості захворювання, досягнутого терапевтичного ефекту і визначається лікарем.

Діти.

Безпека та ефективність застосування «Стрептоцидової мазі 10 %» дітям не встановлені, тому застосовувати препарат цій категорії пацієнтів не рекомендується.

Передозування.

Можливе посилення проявів побічних реакцій.

Побічні реакції.

При підвищеній чутливості до сульфаніламідних засобів можливі алергічні реакції, включаючи дерматит, кропив'янку, розвиток яких потребує негайної відміни препарату.

Термін придатності. 5 років.

Умови зберігання.

Зберігати у захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С.
Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 25 г у тубах в пачці з картону або без пачки.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник/заявник.

ТОВ «Тернофарм».

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності/ місцезнаходження заявника.

Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4.

Дата останнього перегляду.

С. Чеш

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного досьє

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного досьє

Максим
узгоджено
16.02.2018 р.

