

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства охорони  
здоров'я України  
*29.11.2017 № 1495*  
Реєстраційне посвідчення  
№ UA/8483/01/01

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування лікарського засобу**  
**М'ЯТИ ПЕРЦЕВОЇ НАСТОЙКА**

**Склад:**

*діюча речовина:* 1 флакон містить настойки м'яти перцевої (*Menthae piperitae folium*) (1 : 20)  
(екстрагент – етанол 90 %) 25 мл;  
*допоміжна речовина:* олія м'яти перцевої.

**Лікарська форма.** Настойка.

*Основні фізико-хімічні властивості:* рідина від зеленого до зелено-бурого кольору, з запахом м'яти перцевої. У процесі зберігання можливе випадання осаду.

**Фармакотерапевтична група.** Протиблювотні засоби та препарати, що усувають нудоту.  
Код АТХ А04А D.

**Фармакологічні властивості.**

*Фармакодинаміка.* Олія м'яти перцевої (містить до 70 % ментолу та його ефірів) та інші біологічно активні речовини, що містяться у листі м'яти перцевої (кетон-ментон, олеанолова та урсолова кислоти, флавоноїдні глікозиди), стимулюючи чутливі рецептори слизових оболонок ротової порожнини та шлунка, рефлекторним шляхом зменшують відчуття нудоти і запобігають блюванню, а також чинять помірну спазмолітичну, заспокійливу та жовчогінну дію.

*Фармакокінетика.* Не вивчалась.

**Клінічні характеристики.**

**Показання.**

Нудота, блювання, розлади травлення, стенокардія, невралгічні болі.

**Протипоказання.**

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Бронхіальна астма і спазмофілія.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Не виявлена.

**Особливості застосування.**

Пацієнтам зі шлунково-стравохідним рефлюксом (печією) слід уникати застосування препарату, оскільки може збільшитися печія.

**Застосування у період вагітності або годування груддю.**

М'яти перцевої настойка містить спирт етиловий, тому препарат не рекомендується застосовувати у період вагітності або годування груддю.



Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Слід мати на увазі, що до складу препарату входить спирт етиловий, тому слід утримуватися від керування автотранспортом або роботи з потенційно небезпечними механізмами.

**Спосіб застосування та дози.**

Препарат приймати внутрішньо до їди. Дорослим і дітям віком від 12 років призначати по 10–15 крапель настойки 3–4 рази на день.

Тривалість лікування залежить від перебігу захворювання та індивідуальної чутливості до препарату.

**Діти.**

Не рекомендується застосовувати «М'яти перцевої настойку» дітям до 12 років через вміст спирту етилового, що входить до складу препарату.

**Передозування.**

Нераціональне застосування препаратів м'яти може призвести до болю у ділянці серця. Терапія симптоматична.

**Побічні реакції.**

Можливі алергічні реакції (у т. ч. гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри, кропив'янка, контактний дерматит). При появі побічних реакцій слід припинити прийом препарату та звернутися до лікаря.

**Термін придатності.** 3 роки.

**Умови зберігання.**

Зберігати у захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

По 25 мл у флаконах-крапельницях або флаконах у пачці або без пачки.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

**Виробник/заявник.**

ТОВ «Тернофарм».


**Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.**

ТОВ «Тернофарм».

Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4

Тел./факс: (0352) 521-444, <http://www.ternopharm.com.ua>.

**Дата останнього перегляду.**



Узгоджено з матеріалами  
реєстраційного дос'є

Узгоджено з матеріалами  
реєстраційного дос'є



Текст узгоджено  
22.08.2017 р.