

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
Л.ОБ. 204 № 1191
Реєстраційне посвідчення
№ UA/8866/01/01

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу

ДУБА КОРА
(QUERCUS CORTEX)

Склад:

діюча речовина: дуба кора;
1 пачка містить дуба кори (*Quercus cortex*) 100 г.

Лікарська форма. Кора.

Основні фізико-хімічні властивості: жолобчасті або зморщені шматочки кори завтовшки не більше 3 мм. Зовнішня поверхня світло-сірого або зеленувато-сірого кольору, частіше гладенька, зрідка із сочевичками. Внутрішня поверхня блідо-коричневого або червонувато-коричневого кольору із дещо рельєфними подовжніми борозенками близько від 0,5 мм до 1 мм завширшки. Злам заїдливий і волокнистий.

Фармакотерапевтична група. Засоби для місцевого застосування у стоматології. Код АТХ А01А D11.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Дуба кора містить дубильні речовини, флавоноїди (кверцетин), кислоти галову та елагову, флобафен, пентозани, пектини, цукри, слиз, білкові речовини, крохмаль, речовини мінеральні. Цей комплекс біологічно активних речовин проявляє в'язучі, протизапальні, протигнільні властивості.

Фармакокінетика.

Не вивчалась.

Клінічні характеристики.

Показання.

Застосовувати зовнішньо у вигляді відвару при стоматитах, гінгівітах, пародонтозах, фарингітах, трахеїтах, запальних захворюваннях ротової порожнини і горла.

Протипоказання.

Індивідуальна підвищена чутливість до біологічно активних речовин, що містяться у лікарському засобі.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Невідома.

Особливості застосування.

Немає особливих заходів безпеки при застосуванні «Дуба кори».



Застосування у період вагітності або годування груддю.

За призначенням лікаря у тому випадку, коли користь для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Не впливає.

Спосіб застосування та дози.

Застосовувати у вигляді відвару: 20 г (2 столові ложки) кори помістити в емальований посуд, залити 200 мл (1 склянка) гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і нагрівати на киплячій водяній бані 30 хв, після чого негайно процідити, залишок віджати до процідженого відвару. Об'єм відвару довести кип'яченою водою до 200 мл. Застосовувати відвар для полоскання ротової порожнини і горла 6–8 разів на день.

Перед застосуванням відвар рекомендується збовтувати.

Тривалість лікування визначається індивідуально з урахуванням перебігу захворювання, стабільності досягнутого терапевтичного ефекту і переносимості препарату.

Діти.

Лікарський засіб застосовувати дітям віком від 3 років за призначенням лікаря.

Передозування.

Повідомлень щодо передозування препарату не надходило.

Побічні реакції.

Алергічні реакції (у тому числі гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри).

Термін придатності. 5 років.

Умови зберігання.

Зберігати у сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С.

Приготовлений відвар зберігати при температурі від 8 °С до 15 °С не більше 2 діб.

Зберігати у недоступному для дітей місці!

Упаковка.

По 100 г у пачці з внутрішнім пакетом.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник/заявник.

ТОВ «Тернофарм».

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності/ місцезнаходження заявника.

Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4.

Тел./факс: (0352) 521-444, <http://www.ternopharm.com.ua>.

Дата останнього перегляду.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного дос'є

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного дос'є

Згодом узгоджено
16.04.2018 р.

