УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства
здравоохранения Украины
20.11.2008 № 2142
Регистрационное удостоверение
№ UA/8888/01/01

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата

ГОРЦА ПТИЧЬЕГО ТРАВА
(POLYGONI AVICULARIS HERBA)

Состав:
действующее вещество: 1 пакет содержит горца птичьего травы (*Polygoni avicularis herba*) – 50 г.

Лекарственная форма. Трава.
Основные физико-химические свойства: кусочки стеблей от 0,5 мм до 2 мм толщиной, разветвленные, с цилиндрическими или несколько угловатыми и продольно-бороздчатыми междоузлиями, покрытые сидячими или короткочерешковыми, сверху голыми листьями, разнообразными по форме и размеру. Прилистники срослись во влагалищевидный раструб, который разорванный и серебристый. Мелкие пазушные цветки имеют 5 зеленовато-белых листочков околоцветника, верхушка которых часто красного цвета. Плоды – трехгранные орешки размером от 2 мм до 4 мм, от коричневого до черного цвета, обычно пятнистые или полосатые.

Фармакотерапевтическая группа. Средства, применяемые в урологии. Код АТХ G04B C.

Фармакологические свойства.
Фармакодинамика. Биологически активные вещества травы предотвращают образование и способствуют выведению мочевых конкрементов при мочекаменной болезни, усиливают диурез, выводят с мочой избыток ионов натрия и хлора, увеличивают фильтрацию в почечных клубочках и уменьшают обратную резорбцию в почечных канальцах, уменьшают проницаемость стенок кровеносных сосудов.
Фармакокинетика. Не изучалась.

Клинические характеристики.
Показания.
В составе комплексной терапии начальных стадий мочекаменной болезни; мочекислого диатеза; послеоперационного периода после удаления мочевых конкрементов; хронической почечной недостаточности; хронического гломерулонефрита, пиелонефрита, воспаления мочевого пузыря в стадии ремиссии.

Противопоказания.
Повышенная индивидуальная чувствительность к биологически активным веществам, содержащимся в лекарственном средстве. Острые воспалительные процессы почек и мочевого пузыря. Тромбофлебит; изменение реологических свойств крови; наличие в мочевыводящих путях камней размером более 6 мм.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.
Не следует применять вместе с антикоагулянтами. В случае необходимости одновременного применения любых других лекарственных средств следует проконсультироваться с врачом.

ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ
35414585

Особенности применения.
Рекомендуется принимать настой через соломинку, чтобы предотвратить попадание его на зубы (возможно растворение эмали и повреждения зубов).

Применение в период беременности или кормления грудью.
Противопоказано.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.
Не влияет.

Способ применения и дозы.
15 г (3 столовые ложки) травы поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на водяной бане 15 минут. Охлаждать при комнатной температуре 45 минут, процедить, остаток отжать к процеженному настою. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл. Взрослым принимать в теплом виде по ⅓–½ стакана 2–3 раза в день за 15–20 минут до еды. Детям по рекомендации врача принимать 2–3 раза в день за 15–20 минут до еды: детям с 14 лет – по ¼ стакана, детям 12–14 лет – по 2 столовые ложки, 7–12 лет – по 1 столовой ложке. Курс лечения – до 20–25 дней. Повторные курсы (не более 4 раз в год) проводить после 10–12-дневного перерыва (после консультации с врачом).
Перед применением настой взбалтывать.

Дети.
Лекарственное средство применять детям с 7 лет.

Передозировка.
Сообщения отсутствуют.

Побочные эффекты.
Возможны аллергические реакции (в т. ч. гиперемия, сыпь, зуд, отек кожи), почечная колика. Длительный прием препарата может привести к дискорилизации зубной эмали и нарушению структуры костной ткани (остеопорозу). При возникновении любых нежелательных реакций следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Срок годности. 2 года.
Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения.
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Приготовленный настой хранить в прохладном (8–15 °С) месте не более 2 суток.

Упаковка.
По 50 г в пачке с внутренним пакетом.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель/заявитель.
ООО «Тернофарм».

Местонахождение производителя и адрес места осуществления его деятельности/ местонахождение заявителя.
ООО «Тернофарм».
Украина, 46010, г. Тернополь, ул. Фабричная, 4.

Дата последнего пересмотра.

Узгоджено з матеріалами реєстраційного досьє

Узгоджено з матеріалами реєстраційного досьє

Текст согласован

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРНОФАРМ" Тернофарм ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ 05514585 УКРАЇНА