

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу
ІНГАЛІПТ-Н

Склад:

Діючі речовини: стрептоцид розчинний, норсульфазол натрію;
1 балон містить стрептоциду розчинного 0,75 г, норсульфазолу натрію 0,75 г;
допоміжні речовини: тимол, олія м'яти перцевої, олія евкаліптова, гліцерин, етанол 96%, полісорбат, сахароза, вода очищена.

Лікарська форма. Спрей для інгаляцій.

Основні фізико-хімічні властивості: прозора рідина від світло-жовтого до темно-жовтого кольору зі специфічним запахом.

Фармакотерапевтична група.

Засоби, що діють на респіраторну систему. Препарати, що застосовують при захворюваннях горла. Антисептики. Різні антисептики.
Код АТХ R02A A20.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Інгаліпт-Н виявляє антибактеріальну та протизапальну дію, а також охолоджувальну та відволікаючу дію. Поєднання вказаних фармакологічних властивостей забезпечує комплексну патогенетичну терапію запальних захворювань верхніх дихальних шляхів і слизової оболонки ротової порожнини. Інгаліпт-Н не виявляє ульцерогенної та загальнотоксичної дії на організм.

Фармакокінетика.

Інгаліпт-Н призначений для місцевого інгаляційного застосування і створює терапевтичну концентрацію головним чином в осередку запалення. В системний кровотік частково всмоктуються сульфаніламідні (стрептоцид розчинний і норсульфазол натрію), які зворотно зв'язуються з білками крові: стрептоцид розчинний на 12-14%, норсульфазол натрію – на 55%. У процесі біотрансформації утворюються ацетильовані форми сульфаніламідів, у вигляді яких вони виводяться нирками. Період напіввиведення стрептоциду розчинного становить 10 годин, норсульфазолу натрію – 1,2 години.

Клінічні характеристики.

Показання.

Гострі запальні захворювання носоглотки і гортані: тонзиліту, фарингіту, ларингіту, афтозного і виразкового стоматиту, стану після тонзилектомії.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до сульфаніламідних засобів та ефірних олій, діти до 3 років.



Зв'язок з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

При одночасному застосуванні Інгаліпту-Н з препаратами, похідними п-амінобензойної кислоти (новокаїн, анестезин, дикаїн), відбувається інактивація антибактеріальної активності сульфаніламідів.

Особливості застосування.

Перед першим застосуванням зробити кілька натисків на розпилювач до появи дисперсного струменя.

Перед застосуванням препарату рекомендується прополоскати порожнину рота теплою кип'яченою водою. З уражених ділянок порожнини рота (виразки, ерозії) за допомогою стерильних тампонів видалити некротичний наліт.

Після зрошування порожнини рота препаратом слід утримуватися від прийому їжі впродовж 15-30 хв.

Після застосування препарату зняти горловий розпилювач зі штоку і промити його теплою водою. Закрити балон захисним ковпачком, щоб запобігти його забрудненню.

Перед застосуванням препарату особам, схильним до алергії, треба обов'язково порадитись з лікарем.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Протипоказань для застосування препарату в період вагітності і годування груддю немає, але необхідно суворо дотримуватися режиму дозування препарату.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Застосування препарату не впливає на здатність керувати транспортними засобами або роботі з іншими механізмами, але водіям слід враховувати можливе спотворення результатів тесту на алкоголь.

Спосіб застосування та дози.

Застосовують дорослим і дітям старше 3 років.

Перед застосуванням Інгаліпту-Н на аерозольний балон необхідно надіти розпилювальну насадку, кілька разів струснути балон, після чого шляхом натискання насадки до упору рівномірно зрошувати препаратом уражену ділянку.

За один сеанс інгаляції здійснюють 2-3 розпилення Інгаліпту-Н і затримують його у порожнині рота 5-7 хвилин.

Препарат застосовують 3-4 рази на день. Курс лікування становить 7-10 днів.

Діти.

Лікування дітей слід проводити під наглядом лікаря. Застосовувати дітям старше 3 років, враховуючи можливість розвитку рефлекторного бронхоспазму.

Передозування.

Випадки передозування не описані. Можливе посилення побічних ефектів.

Лікування: відміна препарату, полоскання порожнини рота теплою кип'яченою водою.

Побічні реакції.

В окремих випадках можливі загальна слабкість, утруднення вдиха, нудота, блювання, місцеві ефекти (відчуття печіння у роті, комка у горлі або першіння), алергічні реакції у вигляді висипання на шкірі, свербіж, набряку у місцях контакту, в осіб з підвищеною чутливістю можливий розвиток ангіоневротичного набряку. У дітей можливий рефлекторний бронхоспазм, зумовлений ефірними оліями.

Термін придатності.

2 роки.



Забороняється користуватися препаратом після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі не вище 25°C. Зберігати в недоступному для дітей місці. Зберігати подалі від вогню.

Упаковка.

По 30 г у балоні алюмінієвому.

Категорія відпуску.

Без рецепта.

Виробник.

ТОВ "Мікрофарм".
Україна, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 20.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

ТОВ "Мікрофарм".
Україна, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 20.

Дата останнього перегляду.



УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства
здравоохранения Украины
№ _____

Регистрационное удостоверение
№ _____

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного средства
ИНГАЛИПТ-Н

Состав:

Действующие вещества: стрептоцид растворимый, норсульфазол натрия;
1 баллон содержит стрептоцида растворимого 0,75 г, норсульфазола натрия 0,75г;
вспомогательные вещества: тимол, масло мяты перечной, масло эвкалиптовое, глицерин, этанол 96%, полисорбат, сахароза, вода очищенная.

Лекарственная форма. Спрей для ингаляций.

Основные физико-химические свойства: прозрачная жидкость от светло-желтого до темно-желтого цвета со специфическим запахом.

Фармакотерапевтическая группа.

Средства, действующие на респираторную систему. Препараты, применяемые при заболеваниях горла. Антисептики. Различные антисептики.
Код АТХ R02A A20.

Фармакологические свойства.

Фармакодинамика.

Ингалипт-Н проявляет антибактериальное и противовоспалительное действие, а также охлаждающее и отвлекающее действие. Комбинация указанных фармакологических свойств обеспечивает комплексную патогенетическую терапию воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей и слизистой оболочки полости рта. Ингалипт-Н не проявляет ulcerогенного и общетоксического действия на организм.

Фармакокинетика.

Ингалипт-Н предназначен для местного ингаляционного применения и создает терапевтическую концентрацию главным образом в очаге воспаления. В системный кровоток частично всасываются сульфаниламиды (стрептоцид растворимый и норсульфазол натрия), которые обратнo связываются с белками крови: стрептоцид растворимый на 12-14%, норсульфазол натрия - на 55%. В процессе биотрансформации создаются ацетилированные формы сульфаниламидов, в виде которых они выводятся почками. Период полувыведения стрептоцида растворимого составляет 10 часов, норсульфазола натрия – 1,2 часа.

Клинические характеристики.

Показания.

Острые воспалительные заболевания носоглотки и гортани: тонзиллита, фарингита, ларингита, афтозного и язвенного стоматита, состояния после тонзилэктомии.



Противопоказания.

Повышенная чувствительность к сульфаниламидным препаратам и эфирным маслам; дети до 3 лет.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.

При одновременном применении Ингалипта-Н с препаратами, производными п-аминобензойной кислоты (новокаин, анестезин, дикаин), происходит инаktivация антибактериальной активности сульфаниламидов.

Особенности применения.

Перед первым применением сделать несколько нажатий на распылитель до появления дисперсной струи.

Перед применением препарата рекомендуется прополоскать ротовую полость теплой кипяченой водой. С пораженных участков полости рта (язвы, эрозии) с помощью стерильных тампонов снять некротический налет.

После орошения полости рта препаратом следует удерживаться от приема еды в течение 15-30 мин.

После применения препарата снять горловой распылитель со штока и промыть его теплой водой. Закрыть баллон защитным колпачком во избежание его загрязнения.

Перед применением препарата лицам, склонным к аллергии, нужно обязательно проконсультироваться с врачом.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Противопоказаний для применения препарата в период беременности и кормления грудью нет, но необходимо строго придерживаться режима дозирования препарата.

Способность влиять на скорость реакций при управлении автотранспортом или другими механизмами.

Применение препарата не влияет на способность управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами, но водителям следует учитывать возможное искажение результатов теста на алкоголь.

Способ применения и дозы.

Применяют взрослым и детям старше 3 лет.

Перед применением Ингалипта-Н на аэрозольный баллон необходимо надеть распылительную насадку, несколько раз встряхнуть баллон, после чего путем нажатия насадки до упора равномерно орошать препаратом пораженный участок.

За один сеанс ингаляции осуществляют 2-3 распыления Ингалипта-Н и задерживают его в полости рта 5-7 минут.

Препарат применяют 3-4 раза в день. Курс лечения составляет 7-10 дней.

Дети.


Лечение детей следует проводить под наблюдением врача. Применять детям старше 3 лет, учитывая возможность развития рефлекторного бронхоспазма.

Передозировка.

Случаи передозировки не описаны. Возможно усиление побочных эффектов.
Лечение: отмена препарата, полоскание полости рта теплой кипяченой водой.

Побочные реакции.

В отдельных случаях возможны общая слабость, затруднение дыхания, тошнота, рвота, местные эффекты (ощущение жжения во рту, комка в горле или першение), аллергические



реакции в виде высыпаний на коже, зуда, отека в местах контакта, у лиц с повышенной чувствительностью возможно развитие ангионевротического отека. У детей возможен рефлекторный бронхоспазм, за счет содержания эфирных масел.

Срок годности.

2 года.

Запрещается использовать препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения.

Хранить при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Хранить вдали от огня.

Упаковка.

По 30 г в баллоне алюминиевом.

Категория отпуска.

Без рецепта.

Производитель.

ООО "Микрофарм".

Украина, 61013, г. Харьков, ул. Шевченко, 20.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности.

ООО "Микрофарм".

Украина, 61013, г. Харьков, ул. Шевченко, 20.

Дата последнего пересмотра.

