

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства охорони  
 здоров'я України  
05.06.2018 № 1071  
Реєстраційне посвідчення  
№ UA/8418/02/01

ІНСТРУКЦІЯ  
для медичного застосування лікарського засобу  
КАЛЕНДУЛИ НАСТОЙКА

**Склад:**

діюча речовина: настоїки квітів календули (*Calendulae flos*) (1 : 10) (екстрагент – етанол 70 %) 40 мл або 50 мл;  
допоміжні речовини: відсутні.

**Лікарська форма.** Настойка.

**Основні фізико-хімічні властивості:** рідина жовто-бурого кольору, з специфічним запахом. В процесі зберігання можливе випадання осаду.

**Фармакотерапевтична група.** Препарати, що сприяють загоюванню ран.  
Код ATX D03AX.

**Фармакологічні властивості.**

**Фармакодинаміка.** Біологічно активні речовини, що містяться в квітках та квіткових кошиках календули (флавоноїдні та каротиноїдні глікозиди, сапоніни, дубильні речовини, ефірна олія, органічні кислоти), чинять протимікробну, протизапальну та помірну жовчогінну дію.

**Фармакокінетика.** Не вивчалась.

**Клінічні характеристики.**

**Показання.**

Місцево – як антисептичний засіб при інфікованих (гнійних) ранах, порізах, опіках шкіри та при запаленні слизових оболонок порожнини рота, ясен (стоматит, гінгівіт), глотки, мигдаликів (фарингіт, ангіна); внутрішньо – як жовчогінний засіб при дискінезіях жовчовивідних шляхів, холангітах, холециститах (у складі комплексної терапії).

**Протипоказання.**

Календули настойка протипоказана при індивідуальній гіперчутливості до будь-якого з компонентів препарату.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Календули настойка посилює дію інших протизапальних та жовчогінних засобів (зокрема препаратів на основі ромашки та деревію).

**При застосуванні одночасно з будь-якими іншими лікарськими засобами слід повідомити лікаря.**

**Особливості застосування.**

Перед початком лікування препаратом слід обов'язково порадитися з лікарем. Препарат містить етанол, тому тривале застосування не рекомендується.



*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

Оскільки до складу лікарського засобу входить етанол, настойку не рекомендується приймати внутрішньо жінкам у період вагітності або годування груддю.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.*

При застосуванні настойки внутрішньо слід утримуватися від керування транспортними засобами або працювати з потенційно небезпечними механізмами.

Седативний ефект розвивається повільно, протягом трьох тижнів.

#### ***Способ застосування та дози.***

Календули настройку приймають внутрішньо за 15–30 хвилин до їди, розводячи у невеликій кількості теплої кип'яченої води. Дорослим рекомендується застосовувати 10–20 крапель настойки 3–4 рази на день протягом 1 місяця. Дітям віком від 12 років – із розрахунку 1 крапля настойки на 1 рік життя 3–4 рази на добу.

Для полоскання порожнини рота 1 чайну ложку календули настойки розводять у склянці теплої кип'яченої води.

Способ застосування препарату для місцевих аплікацій залежить від характеру ураження шкіри і визначається лікарем.

Тривалість лікування визначають індивідуально.

#### ***Діти.***

Оскільки до складу препарату входить етанол, настойку не рекомендується застосовувати дітям віком до 12 років.

#### ***Передозування.***

Повідомлення відсутні.

#### ***Побічні реакції.***

Препарат зазвичай переноситься добре, проте у деяких хворих при індивідуальній підвищенні чутливості можливий розвиток алергічних реакцій (у тому числі почевоніння шкіри, висипання, свербіж, ангіоневротичний набряк). При прийомі внутрішньо можливе відчуття гіркоти в роті, відчуття печіння в епігастральній ділянці, біль у животі.

#### ***Термін придатності.*** 4 роки.

*Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.*

#### ***Умови зберігання.***

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C.

Зберігати в недоступному для дітей місці. Під час зберігання можливе випадання осаду.

#### ***Упаковка.***

По 40 мл або по 50 мл у флаконах скляніх або полімерних.

#### ***Категорія відпуску.*** Без рецепта.

#### ***Виробник/заявник.***

ТОВ «Тернофарм».

**Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.**  
Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4.

#### ***Дата останнього перегляду.***

Угода про залучення з матеріалами  
регистраційного досьє

зроблено з матеріалами  
регистраційного досьє



Марк

І. Векслер Узгоджено  
20.02.2018р.

БРД