

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
11.12.2019 № 8446
Реєстраційне посвідчення
№ UA/1354/01/01

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу

ЛИПОВИЙ ЦВІТ
(TILIAE FLOS)

Склад:

діюча речовина: липи квітки (*Tiliae flos*).

Лікарська форма. Чай.

Основні фізико-хімічні властивості: фільтр-пакет: порошкоподібна маса, яка складається з суміші частин і шматочків різної форми жовто-зеленого кольору, з включеннями білого і кремового кольору різних відтінків. Запах сильний, ароматний; пакет: суміш квіток, квітконіжок і шматочків приквіток різної форми жовто-зеленого кольору, з включеннями білого і кремового кольору різних відтінків. Запах сильний, ароматний.

Фармакотерапевтична група.

Препарати, що застосовуються при захворюваннях горла. Код ATX R02A A20.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Фіточай «Липовий цвіт» має потогінну і протизапальну дію. Застосування фіточай «Липовий цвіт» при застудних і гострих респіраторних захворюваннях, що супроводжуються пропасницею, катаральними явищами і загальним нездужанням, сприяє зниженню температури тіла і поліпшенню загального самопочуття. Проявляє місцевий протизапальний ефект. Поліпшує функції серцево-судинної системи, підвищує резистентність організму і стійкість до інфекції.

Фармакокінетика. Не вивчалась.

Клінічні характеристики.

Показання.

Внутрішньо – при застудних захворюваннях, бронхітах, зовнішньо – при ангінах, стоматитах, ларингітах, гінгівітах (у складі комплексної терапії).

Протипоказання.

Гіперчутливість до біологічно активних речовин лікарського засобу. Поліноз.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.
Невідома.

Особливості застосування.

Застосування у період вагітності або годування грудлю.

За призначенням лікаря у тому випадку, коли користь для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного досьє



Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.
Не впливає.

Спосіб застосування та дози.

2 столові ложки липи квіток помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хвилин. Охолоджувати при кімнатній температурі впродовж 45 хвилин, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'ячену водою до 200 мл.

Застосовувати у теплому вигляді 2–3 рази на добу після їди: дорослим та дітям віком від 14 років – по 1/2–1 склянці, дітям віком 12–14 років – по 1/3 склянки, 7–12 років – по 1/4 склянки, 3–7 років – по 2 столові ложки. Зовнішньо застосовувати для полоскання ротової порожнини і горла 3–4 рази на добу. Перед застосуванням настій збовтати.

3 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хвилин. Застосовувати у теплому вигляді 2–3 рази на добу після їди: дорослим та дітям віком від 14 років – по 1 склянці, дітям віком 12–14 років – по 1/2 склянки, 7–12 років – по 1/3 склянки, 3–7 років – по 1/4 склянки. Зовнішньо застосовувати для полоскання ротової порожнини і горла 3–4 рази на добу.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Діти.

Лікарський засіб призначати дітям віком від 3 років.

Передозування.

Повідомлення відсутні.

Побічні реакції.

Алергічні реакції (у т. ч. гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри). При появі побічних реакцій слід припинити застосування препарату та звернутися до лікаря.

Термін придатності. 2 роки.

Умови зберігання.

Зберігати у сухому, захищенному від світла місці.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 1,5 г у фільтр-пакеті, по 25 фільтр-пакетів у картонній пачці, по 40 г у пачці з внутрішнім пакетом.

Категорія відпуску.

Без рецепті.

Виробник/заявник.

ТОВ «Тернофарм».

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності/ місцезнаходження заявника.

Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4.

Тел./факс: (0352) 521-444, www.ternopharm.com.ua

Дата останнього перегляду.

*Олеся Іванівна
Бекет*

Узгоджено
21.10.2019 р.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного досьє

