

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
22.05.2016 № 436
Реєстраційне посвідчення
№ UA/4341/01/01

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу

ПЕРЦЮ ВОДЯНОГО ЕКСТРАКТ

Склад:

діюча речовина: 1 флакон містить екстракту рідкого з трави водяного перцю (*Herba Polygoni hydroperis*) (1:1) (екстрагент – етанол 70 %) – 25 мл;
допоміжні речовини, крім екстрагенту, відсутні.

Лікарська форма. Екстракт рідкий для перорального застосування, спиртовий.

Основні фізико-хімічні властивості: рідина зеленувато-бурого кольору, має духмяний запах.

Фармакотерапевтична група. Код АТХ.

Гемостатичний, кровоспинний засіб рослинного походження.
Код АТХ B02B X.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Біофлавоноїди, що містяться у водяному перці (рутин, кверцетин, гіперозид, рамнозин, кемпферол, мірицетин, лютеолін), проявляють Р-вітамінну активність, зменшують проникність капілярів, нормалізують структуру судинної стінки, оберігають від окиснення аскорбінову кислоту, що міститься у водяному перці. Разом з аскорбіновою кислотою беруть участь в окисно-відновних реакціях, знижують активність гіалуронідази. Дубильні речовини проявляють протизапальну і в'язучу дію, спричиняють синергічний ефект з біофлавоноїдами щодо кровоспинної дії.

Фармакокінетика.

Максимальна фармакологічна дія біофлавоноїдів перцю водяного досягається за рахунок екстракції 70 % етиловим спиртом. При даній концентрації в ньому розчиняються флавоноїди, що знаходяться як у вільній (аглікон), так і в зв'язаній (з глікозидною частиною) формі. Цим досягається максимальне всмоктування основних речовин, що діють через мікроросинки ШКТ у кров. Після проходження окисно-відновних реакцій з участю флавоноїдів вони піддаються гідролізу на аглікон і глікозид. Аглікон виділяється нирками з сечею і через кишечник з жовчю, останній (вуглеводний залишок) або окиснюється в цикл Кребса до двоокису вуглецю і води, або депонується у вигляді глікогену в організмі.

Клінічні характеристики.

Показання.

Як допоміжний засіб застосовувати в акушерсько-гінекологічній практиці при маткових післяпологових кровотечах, при субінволюції матки, гіперменорагії. Крім того, застосовувати при кровотечах із дрібних судин шлунка, кишечнику, при несильних гемороїдальних кровотечах.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Особливі заходи безпеки.

У процесі зберігання препарату допускається випадання осаду. Не застосовувати разом з молочними продуктами для запобігання утворенню комплексів (хелатних), що не всмоктуються.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

На даний час взаємодія з іншими лікарськими препаратами не виявлена.

Особливості застосування.**Застосування у період вагітності або годування груддю.**

Питання про призначення препарату у період вагітності або годування груддю вирішується індивідуально з урахуванням коефіцієнта користь/ризик.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Оскільки у складі препарату міститься етанол, не рекомендується застосовувати Перцю водяного екстракт під час керування автомобілем та проведення робіт із застосуванням потенційно небезпечних механічних пристроїв.

Спосіб застосування та дози.

Перцю водяного екстракт дорослим та дітям віком від 12 років приймати по 30–40 крапель 3–4 рази на добу (за 30 хв до їди). Курс лікування залежить від перебігу та тяжкості захворювання, досягнутого ефекту, характеру комплексної терапії.

Діти.

Не застосовувати дітям віком до 12 років через вміст етанолу.

Передозування.

У разі перевищення дози лікування симптоматичне.

Побічні реакції.

Головний біль, нудота, блювання, запаморочення; у поодиноких випадках можливі алергічні реакції, в тому числі шкірний висип, почервоніння, свербіж.

Термін придатності. 3 роки 6 місяців.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 25 мл у флаконі-крапельниці у пачці або без пачки.

Категорія відпуску.

Без рецепта.

Виробник.

ТОВ «Тернофарм».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

ТОВ «Тернофарм».
Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4.
Тел./факс: (0352) 521-444, <http://www.ternopharm.com.ua>.

Дата останнього перегляду.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного доосьє та достовірно
відомими даними щодо застосування
лікарського засобу

Тернофарм
Тернофарм
23.03.2016