

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
М. П. ВО № *1810*
Ресстраційне посвідчення
№ UA/9006/01/01

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу
НАГІДОК КВІТКИ

Склад:

діюча речовина: нагідок квітки;
1 пакет містить нагідок квітки (*Calendulae flos*) 50 г.

Лікарська форма. Квітки.

Основні фізико-хімічні властивості: цілі або різані, висушені повністю розкриті квітки, без ложа кошика, махрових форм та суцвіття – кошики, а також кошики немахрових форм *Calendula officinalis* L., що культивуються.

Фармакотерапевтична група. Антисептичні засоби. Код АТХ R02A A20.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Нагідок квітки містять каротиноїди (каротин, лікопін, віолаксантин, цитраксантин, рубіксантин, флавохром), флавоноїди (нарцисин, рамнетин, ізорамнетин-3-триглюкозид, ізокверцитрин), олію ефірну, сапоніни, гірку речовину календен, речовини смолисті і дубильні, слиз, інулін, кислоти органічні (яблучна, саліцилова, пентадецилова), фітостерин, ферменти, вітамін С, алкалоїди. Цей комплекс біологічно активних речовин чинить протизапальну, ранозагоювальну, бактерицидну, спазмолітичну і жовчогінну дію, прискорює процеси регенерації тканин. Препарати із квіток нагідок при внутрішньому застосуванні сприяють регенерації слизових оболонок шлунка і кишечника, прискорюють загоєння виразок та ерозій, чинять седативну, м'яку гіпотензивну дію, сприяють нормалізації серцевої діяльності.

Фармакокінетика.

Не вивчалась.

Клінічні характеристики.

Показання.

Внутрішньо застосовувати при гастритах, виразковій хворобі шлунка і дванадцятипалої кишки, колітах, ентероколітах, запальних захворюваннях печінки, жовчовивідних шляхів та селезінки, зовнішньо – при захворюваннях ротової порожнини (молочниця у дітей, гінгівіти, піорея, запально-дистрофічна форма пародонтозу); при ангінах, тонзилітах – у складі комплексної терапії.

Протипоказання.

Індивідуальна підвищена чутливість до біологічно активних речовин, що містяться у лікарському засобі.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Невідома.



Особливі заходи безпеки.

При застосуванні «Нагідок квіток» внутрішньо не перевищувати рекомендовані дози.

При виразковій хворобі і гастриті з підвищеною кислотністю застосовувати разом з антацидами і спазмолітиками.

Особливості застосування.

«Нагідок квітки» є традиційним лікарським засобом рослинного походження для застосування відповідно до показань, підтверджених тривалим застосуванням.

Пацієнт повинен проконсультуватися з лікарем, якщо симптоми захворювання не зникли під час застосування лікарського засобу або спостерігаються побічні реакції, не зазначені в інструкції для медичного застосування лікарського засобу.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

У період вагітності або годування груддю «Нагідок квітки» слід призначати тільки тоді, коли очікувана користь для матері переважає потенційний ризик для плода або дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Не впливає.

Спосіб застосування та дози.

1 столову ложку неподрібнених квіток помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Застосовувати у теплому вигляді 3 рази на добу за 15–20 хв до їди: дорослим та дітям віком від 14 років – по ½ склянки, дітям 12–14 років – по ¼ склянки, 7–12 років – по 2 столові ложки, 3–7 років – по 1 десертній ложці. Перед застосуванням настій збовтати.

Зовнішньо застосовувати для полоскання ротової порожнини і горла 3–4 рази на добу.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Діти.

Внутрішньо лікарський засіб застосовувати дітям від 3 років за призначенням лікаря.

Передозування.

Повідомлень щодо передозування препарату не надходило.

Побічні реакції.

При індивідуальній підвищеній чутливості до препарату можливий розвиток алергічних реакцій, включаючи гіперемію, висипання, свербіж та набрякання шкіри.

При появі побічних реакцій слід припинити прийом препарату та звернутися до лікаря.

Термін придатності. 2 роки.

Умови зберігання.

Зберігати у сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С.

Приготовлений настій зберігати не більше 2 діб у прохолодному місці.

Зберігати у недоступному для дітей місці!

Упаковка.

По 50 г у пачці з внутрішнім пакетом.

Категорія відпуску. Без рецепта.



Виробник/заявник.
ТОВ «Тернофарм».

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності/
місцезнаходження заявника.

Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4.
Тел./факс: (0352) 521-444, <http://www.ternopharm.com.ua>.

Дата останнього перегляду.

С.Чем

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного досьє

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного досьє

С.Чем

21.08.18

