

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування лікарського засобу**

**НАШАТИРНО-Анісові краплі**

**Склад:**

*діючі речовини:* 1 мл препарату містить олії анісової 0,0281 г, аміаку розчину 10 % 0,15 мл;  
*допоміжна речовина:* етанол розведений.  
1 крапля (0,02 мл) містить 70 % (0,014 мл) етанолу розведеного.

**Лікарська форма.** Краплі оральні, розчин.

*Основні фізико-хімічні властивості:* прозора безбарвна або злегка жовтуватого кольору рідина з сильним анісовим та аміачним запахом.

**Фармакотерапевтична група.** Засоби, що застосовують при кашлі та застудних захворюваннях. Відхаркувальні засоби.

Код АТХ R05C A10.

**Фармакологічні властивості.**

*Фармакодинаміка.* Комбінований лікарський засіб з відхаркувальною дією. Анісова олія стимулює секрецію бронхіальних залоз, аміак сприяє розріджуванню мокротиння та його легкому відходженню. Крім того, анісова олія сприяє травленню і виявляє вітрогінну та антисептичну дію. Внаслідок лікування у хворих покращується травлення, нормалізується секреторна і моторна функції шлунка та кишечника, зникає метеоризм.

*Фармакокінетика.* Не вивчалась.

**Клінічні характеристики.**

**Показання.**

У комплексному лікуванні захворювань органів дихання: фарингіти, трахеїти, бронхіти (гострий та хронічний), бронхопневмонії, коклюш у дітей.

**Протипоказання.**

«Нашатирно-анісові краплі» не призначати при індивідуальній непереносимості препарату.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Препарати термопсису, алтеї, інші відхаркувальні засоби посилюють терапевтичний ефект «Нашатирно-анісових крапель».


Необхідно уникати одночасного застосування інших лікарських засобів, що містять етанол.

**Особливості застосування.**

При застосуванні препарату слід утримуватися від вживання алкоголю.

Лікарський засіб містить етанол! Не рекомендується застосування препарату протягом тривалого часу.

*Застосування у період вагітності або годування груддю.* Лікарський засіб не слід застосовувати у період вагітності або годування груддю.



*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. У період лікування слід утримуватись від керування автомобілем та роботи зі складними механізмами.*

**Спосіб застосування та дози.**

«Нашатирно-анісові краплі» застосовувати внутрішньо. Дітям з 12 до 14 років – 10–12 крапель (розвести в 1 столовій ложці рідини). Дорослим і дітям з 14 років – 10–15 крапель (розвести в 1 столовій ложці рідини).

Приймати «Нашатирно-анісові краплі» 3–4 рази на день. Тривалість лікування визначає лікар залежно від досягнутого ефекту, переносимості лікарського засобу та характеру комплексної терапії.

«Нашатирно-анісові краплі» призначати у комплексній терапії з препаратами термопсису, алтеї та іншими відхаркувальними засобами, а також, у разі необхідності, з антибіотиками та іншими протизапальними засобами.

*Діти.* Застосовувати дітям з 12 років.

**Передозування.**

Не виявлене.

**Побічні реакції.**

Алергічні реакції, у тому числі висипи на шкірі, свербіж, гіперемія, набряк, бронхоспазм.

**Термін придатності.** 2 роки.

**Умови зберігання.**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

По 25 мл у флаконах або у флаконах-крапельницях, у пачках або без пачок.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

**Виробник/заявник.**

ТОВ «Тернофарм».

**Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності/ місцезнаходження заявника.**

ТОВ «Тернофарм».

Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4.

**Дата останнього перегляду.**



Узгоджено з матеріалами  
реєстраційного досьє

Узгоджено з матеріалами  
реєстраційного досьє

Текст узгоджено  
26.10.2018р.

