

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора
Департамента лекарственного
обеспечения и медицинской техники
Министерства здравоохранения
Кыргызской Республики
Дуйшеналиев Н.К.



2017 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

ПАНТЕНОЛ

Торговое название
ПАНТЕНОЛ

Международное непатентованное название
Декспантенол

Состав

1 г препарата содержит

Действующее вещество: декспантенола 50 мг (в пересчете на 100 % вещество);

Вспомогательные вещества: спирт цетостеариловый (тип А) эмульгирующий, метилпарагидроксibenзоат (Е 218), макроголглицерол кокоат, пропиленгликоль, калия дигидрофосфат, натрия гидрофосфат додекагидрат, вода очищенная, тетрафторэтан.

Лекарственная форма

Аэрозоль для наружного применения.

Описание

Пена белого цвета со слабым специфическим запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Другие препараты для лечения гиперрубцевания. Декспантенол.

Код АТХ D03A X03.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Декспантенол – производное пантотеновой кислоты (витамина В₅). Оказывает репаративное действие, стимулируя образование и функцию эпителиальной ткани, обладает противовоспалительной активностью, устраняет дефицит пантотеновой кислоты. В организме образует активный метаболит – пантотеновую кислоту, являющуюся субстратным стимулятором синтеза кофермента А, который играет центральную роль в клеточном метаболизме: катализируя ацилирование и окисление, участвует практически во всех метаболических процессах (цикл трикарбоновых кислот, обмен углеводов, жирных кислот, фосфолипидов, белков и др.), обеспечивает образование кортикостероидов, ацетилхолина и порфиринов.

Фармакокинетика

При наружном применении декспантенол быстро абсорбируется кожей, превращаясь в пантотеновую кислоту. Особенно хорошо проникает в пораженную ткань. Пантотеновая кислота связывается с белками плазмы (в основном с бета-глобулином и альбумином); она

не подвергается биотрансформации и выводится из организма в неизменном виде преимущественно с мочой (60-70 %) и калом.

Показания к применению

Применяется при разных повреждениях кожи и слизистых оболочек, в том числе при ссадинах, ожогах, асептических послеоперационных ранах, трансплантации кожи, буллезном и пузырьчатом дерматитах.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к любому компоненту препарата, гнойные раны с обильной экссудацией.

Способ применения и дозы

Пантенол аэрозоль равномерно распылять на поврежденный участок один или несколько раз в сутки.

Распыляя препарат, держите контейнер вертикально, клапаном вверх. Чтобы получить качественную пену, необходимо энергично встряхивать контейнер перед каждым применением, особенно если его не использовали в течение длительного времени. Если препарат применяется впервые, сначала может распыляться только пропеллент, прежде чем образуется пена.

Насадку подводят к пораженному участку и плавно нажимают на нее, равномерно распыляя препарат на пораженный участок на расстоянии 10-20 см в течение 1-2 секунд.

Длительность лечения зависит от вида и течения заболевания и определяется после консультации с врачом.

Если Пантенол аэрозоль применять на участок лица, его не следует распылять непосредственно на лицо. Желательно распылить препарат на руку и распределить его на соответствующей части лица. Не распылять препарат в глаза, непосредственно в рот или в нос.

Побочные эффекты

Аллергические реакции, включая контактный дерматит, аллергический дерматит, зуд, эритема, экзема, сыпь, крапивница, раздражение кожи и пузырьки.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

При применении Пантенол аэрозоля взаимодействие с другими лекарственными средствами неизвестно.

Надлежащие меры безопасности при применении

Контейнер под давлением. Предохранять от падений, ударов и воздействия прямых солнечных лучей, нагревания свыше 50 °С. Не раскрывать и не сжигать даже после полного использования пены, выбрасывать только после полного выпуска газа. Не распылять вблизи открытого огня или раскаленных предметов.

Контейнер держать вертикально. При первом применении препарата необходимо тщательно встряхнуть контейнер, выпустить первую порцию до появления пены и только потом наносить препарат на поврежденную поверхность.

Необходимо избегать попадания пены в глаза. При случайном попадании пены в глаза их следует промыть водой.

Особые предостережения

Препарат не следует наносить на раны, ожоги, трофические и лучевые язвы с обильной гнойной экссудацией, поскольку он предназначен для применения в фазе регенерации и для профилактики лучевых осложнений.

Применение в период беременности или кормления грудью

Пантотенат проникает сквозь плацентарный барьер путем активного транспортного процесса и выделяется в грудное молоко пропорционально к его поглощению.

Поскольку системная доступность декспантенола после местного применения неизвестна, при необходимости применения Пантенол аэрозоля в период беременности или кормления грудью на большие участки кожи следует тщательно взвесить пользу от применения препарата для матери и возможный риск для плода/ребенка. В течение беременности возможно применение препарата по назначению врача. При применении для лечения трещин сосков в период кормления грудью препарат следует смывать перед кормлением.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами

Специальные предупреждения отсутствуют.

Дети

Детям препарат следует применять по назначению врача и под присмотром взрослых.

Передозировка

При применении Пантенол аэрозоля в соответствии с инструкцией передозировка маловероятна.

В случае применения большого количества препарата внутренние токсические эффекты не ожидаются. При возникновении желудочно-кишечных расстройств лечение симптоматическое.

Срок годности

2 года.

Не применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 58 г или 116 г в контейнерах алюминиевых с распылителем и защитным колпачком.

Каждый контейнер вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку.

Условия отпуска.

Без рецепта.

Название и местонахождение производителя

ООО «Микрофарм».

61013, Украина, г. Харьков, ул. Шевченко, 20.