

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
04.10.2018 № 1810
Реєстраційне посвідчення
№ UA/8886/01/01

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу

РОМАШКИ КВІТКИ

Склад:

діюча речовина: ромашки квітки;
1 пакет містить ромашки квіток (*Chamomillae flos*) 50 г.

Лікарська форма. Квітки.

Основні фізико-хімічні властивості: суміш цільних, подрібнених, частково осипаних квіткових кошиків, трубчастих та несправжньоаязичкових квіток, квітколож із домішками шматочків стебел та листків. Колір від світло-жовтого до жовтувато-зеленого з білими і коричнюватими вкрапленнями.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що впливають на систему травлення та метаболічні процеси. Код АТХ А16А Х.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Біологічно активні речовини лікарського засобу чинять спазмолітичну, болезаспокійливу, протизапальну, антисептичну, потогінну, жовчогінну і седативну дію; знижують алергічні реакції, посилюють процеси регенерації, підвищують секреторну діяльність травних залоз, збуджують апетит, усувають спазми кишечника, зменшують бродильні процеси.

Фармакокінетика.

Не вивчалась.

Клінічні характеристики.

Показання.

Внутрішньо, у складі комплексного лікування, застосовувати при гастритах, запальних захворюваннях печінки та жовчного міхура, ентероколітах, метеоризмі, застудних захворюваннях. Зовнішньо – при запальних захворюваннях порожнини рота і горла.

Протипоказання.

Гіперчутливість до біологічно активних речовин лікарського засобу.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Невідома.

Особливості застосування.

«Ромашки квітки» є традиційним лікарським засобом рослинного походження для застосування відповідно до показань, підтверджених тривалим застосуванням. Пацієнт повинен проконсультуватися з лікарем, якщо симптоми захворювання не зникли під час застосування лікарського засобу або спостерігаються побічні реакції, не зазначені в інструкції для медичного застосування лікарського засобу.



Застосування у період вагітності або годування груддю.

За призначенням лікаря, якщо користь для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Не впливає.

Спосіб застосування та дози.

3 столові ложки квіток помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл.

Застосовувати у теплому вигляді 3 рази на добу після їди: дорослим та дітям віком від 14 років по 1/3 склянки, дітям віком 12–14 років – по 1/4 склянки, 7–12 років – по 2 столові ложки, 3–7 років – по 1 столовій ложці, 1–3 років – по 1 десертній ложці, 6 місяців – 1 рік – по 1/2–1 чайній ложці. Зовнішньо настій застосовувати для полоскань 3–4 рази на добу. Перед застосуванням настій збовтати.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Діти.

Застосовувати дітям віком від 6 місяців за призначенням лікаря.

Передозування.

Повідомлення відсутні.

Побічні реакції.

Можливі алергічні реакції (у т. ч. гіперемія, висипи, свербіж та набряк шкіри). При появі побічних реакцій слід припинити прийом лікарського засобу.

Термін придатності. 1 рік.

Умови зберігання.

Зберігати у сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С.

Приготовлений настій зберігати при температурі від 8 °С до 15 °С не більше 2 діб.

Зберігати у недоступному для дітей місці!

Упаковка.

По 50 г у пачці з внутрішнім пакетом.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник/заявник.

ТОВ «Тернофарм».

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності/ місцезнаходження заявника.

Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4.

Тел./факс: (0352) 521-444, <http://www.ternopharm.com.ua>.

Дата останнього перегляду.

С. Чеш

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного досьє

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного досьє

Александр Ужовиченко
31.07.18

