

**ІНСТРУКЦІЯ**  
для медичного застосування лікарського засобу

**ШАВЛІ ЛИСТЯ**  
**(SALVIAE OFFICINALIS FOLIUM)**

**Склад:**

діюча речовина: шавлії листя (*Salviae officinalis folium*);  
1 пакет містить шавлії листя (*Salviae officinalis folium*) 50 г.

**Лікарська форма.** Листя.

**Основні фізико-хімічні властивості:** шматочки листків різної форми з домішками інших частин рослини (шматочки стебел, квіток). Колір зелений, сірувато-зелений або сріблясто-білий. Запах приємний.

**Фармакотерапевтична група.** Засоби для застосування у стоматології. Код АТХ А01А D11.

**Фармакологічні властивості.**

**Фармакодинаміка.** Біологічно активні речовини листя ущільнюють епітеліальні тканини, знижують проникність клітинних мембран, зміцнюють стінки ушкоджених кровоносних судин. Чинять в'яжучу, протизапальну, антисептичну та кровоспинну дію.

**Фармакокінетика.** Не вивчалась.

**Клінічні характеристики.**

**Показання.**

Захворювання ротової порожнини (стоматити, гінгівіти, пародонтози) і верхніх дихальних шляхів (ларингіти, фарингіти, трахеїти).

**Протипоказання.**

Гіперчутливість до біологічно активних речовин лікарського засобу.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Невідома.

**Особливості застосування.**

**Застосування у період вагітності або годування груддю.**

За призначенням лікаря у тому випадку, коли користь для матері переважає ризик для плода/дитини.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.**

Не впливає.

**Спосіб застосування та дози.**

1 столову ложку листя помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити яри



кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, віджати залишок до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл.

Зовнішньо застосовувати для інгаляцій та полоскань – 3–4 рази на добу: дорослим та дітям віком від 12 років – у нерозведеному вигляді; дітям віком 7–12 років – 4 столові ложки настою розвести у 200 мл кип'яченої води; дітям віком 3–7 років – 2 столові ложки настою розвести у 200 мл кип'яченої води.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

**Діти.**

Лікарський засіб застосовувати дітям віком від 3 років за призначенням лікаря.

**Передозування.**

При передозуванні можливе посилення побічних реакцій.

**Побічні реакції.**

Алергічні реакції (у тому числі гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри). При появі побічних реакцій слід припинити застосування препарату та звернутися до лікаря.

**Термін придатності.** 1 рік 6 місяців.

**Умови зберігання.**

Зберігати у сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Приготовлений настій зберігати у прохолодному місці не більше 2 діб.

**Упаковка.**

По 50 г у пачці з внутрішнім пакетом.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

**Виробник/заявник.**

ТОВ «Тернофарм».

**Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності/ місцезнаходження заявника.**

ТОВ «Тернофарм».

Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4.

**Дата останнього перегляду.**

*С. С. С.*

Узгоджено з матеріалами  
реєстраційного дос'є

Узгоджено з матеріалами  
реєстраційного дос'є

*Текст узгоджено  
24.05.2018р.*

