

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства
здравоохранения Украины
28.05.2019 № 1186
Регистрационное удостоверение
№ UA/14079/01/01

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного средства
ШИПОВНИКА ПЛОДЫ

Состав:

действующее вещество: шиповника плоды;
1 пачка содержит шиповника плодов (*Rosae fructus*) 130 г.

Лекарственная форма. Плоды.

Основные физико-химические свойства: ложный плод, который состоит из мясистого, пустотелого, разросшегося цветоложа с остатками редуцированных чашелистиков бледно-розового или оранжево-красного цвета, внешняя поверхность которых выпуклая, блестящая и морщинистая, внутренняя поверхность светлее, обильно выстлана щетинистыми волосками.

Фармакотерапевтическая группа. Средства, влияющие на систему пищеварения и метаболические процессы. Код АТХ А16А Х.

Фармакологические свойства.

Фармакодинамика. Биологически активные вещества шиповника плодов оказывают антисклеротическое, противовоспалительное действие; активизируют ферментные системы и окислительно-восстановительные процессы в организме, нормализуют углеводный обмен, усиливают синтез гормонов и регенерацию тканей, повышают сопротивляемость организма к неблагоприятным факторам окружающей среды, повышают секрецию желчи, увеличивают диурез, уменьшают ломкость и проницаемость капилляров.

Фармакокинетика. Не изучалась.

Клинические характеристики.

Показания.

Общеукрепляющее средство при острых и хронических инфекциях, дистрофии, физических нагрузках; геморрагические диатезы; кровотечения разной этиологии, передозировка антикоагулянтов; острые и хронические заболевания печени (хронический гепатит, холецистит, холангит); заболевания почек и мочевого пузыря (нефриты, нефропатии у беременных) – в составе комплексной терапии.

Противопоказания.

Гиперчувствительность к биологически активным веществам лекарственного средства. Тромбофлебит и склонность к нему, недостаточность кровообращения, эндокардит, декомпенсированный сахарный диабет, тяжелые заболевания почек, желчнокаменная болезнь.


Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.
Неизвестно.

Особенности применения.

После применения настоя шиповника плодов рекомендуется полоскание ротовой полости теплой водой или слабым раствором соды для предупреждения повреждения зубной эмали.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного досьє

реєстраційного досьє



Применение в период беременности или кормления грудью.

Безопасность и эффективность лекарственного средства в период беременности и кормления грудью не изучались, поэтому препараты шиповника применяют после консультации с врачом только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.

Не влияет.

Способ применения и дозы.

1 столовую ложку плодов помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, закрывают крышкой и настаивают на кипящей водяной бане 15 мин. Охлаждают при комнатной температуре 45–60 минут, процеживают, остаток отжимают к процеженному настою. Объем настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Настой принимать в теплом виде 2 раза в сутки после еды: взрослым и детям старше 14 лет – по 1/2 стакана, детям в возрасте от 1 до 3 лет – по 1 десертной ложке, от 3 до 7 лет – по 1 столовой ложке, от 7 до 10 лет – по 2 столовые ложки, от 10 до 14 лет – по 1/3 стакана.

Продолжительность курса лечения определяется врачом индивидуально с учетом характера, степени тяжести и особенностей течения заболевания, стабильности достигнутого терапевтического эффекта и переносимости лекарственного средства.

Дети.

Лекарственное средство применяют детям старше 1 года.

Передозировка.

Появление или усиление аллергических реакций. Терапия симптоматическая.

Побочные реакции.

Возможно развитие аллергических реакций (в т. ч. гиперемия, зуд, отек кожи).

Срок годности. 2 года.

Условия хранения.

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Приготовленный настой хранят при температуре от 8 до 15 °С не более 2 суток.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка.

По 130 г в пачке с внутренним пакетом.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель/заявитель.

ООО «Тернофарм».

Местонахождение производителя и адрес места осуществления его деятельности/ местонахождение заявителя.

Украина, 46010, г. Тернополь, ул. Фабричная, 4.

Тел./факс: (0352) 521-444, www.ternopharm.com.ua

Дата последнего пересмотра.

Узгоджено з матеріалами реєстраційного досьє

Узгоджено з матеріалами реєстраційного досьє

Заявитель узгоджено 22.03.2019р.

