

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства охорони  
здоров'я України  
14.06.2018 № 1191  
Реєстраційне посвідчення  
Чт 18420/01/01

ІНСТРУКЦІЯ  
для медичного застосування лікарського засобу  
**СПИРТ МУРАШИНІЙ**

**Склад:**

діюча речовина: кислота мурашина;  
100 мл препарату містять кислоти мурашиної 1,4 г;  
допоміжна речовина: етанол 70 %.

**Лікарська форма.** Розчин для зовнішнього застосування, спиртовий.

**Основні фізико-хімічні властивості:** прозора, безбарвна рідина із специфічним різким запахом.

**Фармакотерапевтична група.** Засоби, що застосовуються місцево при суглобовому та м'язовому болю.

Код ATХ M02A X10.

**Фармакологічні властивості.**

Спирт мурашиний відноситься до засобів, що подразнюють чутливі нервові закінчення. Внаслідок стимуляції рецепторів шкіри і підшкірних тканин препарат виявляє не тільки рефлекторний, а й загальний гуморальний вплив. Подразнення Спиртом мурашиним рецепторів супроводжується стимуляцією утворення і вивільнення ендорфінів, динорфінів, пептидів, що відіграють важливу роль в регуляції більових відчуттів, проникності судин та інших процесів.

**Клінічні характеристики.**

**Показання.**

Невралгії, міозити, артраплгії.

**Протипоказання.**

Підвищена чутливість до препарату. Екземи, запальні та інфекційні захворювання шкіри, локалізовані в ділянці його застосування, а також алергічні захворювання.

**Особливі заходи безпеки.**

Запобігати потрапляння препарату на слизові оболонки та в очі.

Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу, це може зашкодити здоров'ю.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

При одночасному застосуванні з препаратами, що містять органічні сполуки, можуть утворюватися нові сполуки, денатурація білкових компонентів.

При одночасному застосуванні будь-яких інших лікарських засобів слід повідомити лікарю.



## **Особливості застосування.**

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

У період вагітності і годування груддю застосування препарату можливе лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.*

Не впливає.

## **Спосіб застосування та дози.**

Спирт муршиний застосовують зовнішньо для розтирання ураженої ділянки тіла. Кратність застосування препарату і тривалість курсу визначаються характером і вираженістю захворювання.

## **Діти.**

Не застосовують дітям віком до 12 років.

## **Передозування.**

Не спостерігалося.

## **Побічні реакції.**

Можливі сильне подразнення шкіри, висипи, утворення пухирів.

У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря.

## **Термін придатності.** 3 роки.

Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

## **Умови зберігання.**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

## **Упаковка.**

По 50 мл у флаконах у пачці з картону або без пачки.

## **Категорія відпуску.** Без рецептів.

## **Виробник/заявник.**

ТОВ «Тернофарм».

## **Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.**

ТОВ «Тернофарм»

Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4.

Тел./факс: (0352) 521-444, [www.ternopharm.com.ua](http://www.ternopharm.com.ua)

## **Дата останнього перегляду:**

*СЧЕЧІ*

Узгоджено з матеріалами  
реєстраційного досьє

*Жекост узгоджено*  
*10.04.2018 р.*

