

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
21.03.2019 № 629
Ресстраційне посвідчення
№ UA/13726/01/01

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу
ЗВІРОБОЮ ТРАВА

Склад:

діюча речовина: herba hyperici;
1 пачка містить звіробою трави 75 г.

Лікарська форма. Трава.

Основні фізико-хімічні властивості: шматочки листя, стебел, квіток різної форми і недозрілих плодів, зеленувато-жовтого, сірувато-зеленого, зеленого, темно-зеленого, яскраво-жовтого або жовтого з чорними крапками, зеленувато-коричневого, іноді рожево-фіолетового кольору.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що впливають на систему травлення та метаболізм. Засоби для застосування у стоматології. Код АТХ А01А D11.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Трава звіробою містить дубильні речовини, флавоноїди (гіперозид, рутин, кверцитрин, мірицетин, лейкоантоціани), сапоніни, барвники (гіперицин, псевдогіперицин, гіперин, франгулаемодинантранол), олію ефірну, смолисті речовини, каротин, кислоту аскорбінову. Цей комплекс біологічно активних речовин має в'язучу, протизапальну і деяку протимікробну дію, що сприяє регенерації тканин, помірно впливає на жовчовиділення, збуджує шлункову секрецію тощо.

Фармакокінетика. Не вивчалась.

Клінічні характеристики.

Показання.

Захворювання печінки і жовчовивідних шляхів (дискінезії жовчних шляхів, гепатити, холецистити); захворювання шлунково-кишкового тракту (гострі і хронічні коліти, проноси, метеоризм, гіпоацидний гастрит); запальні процеси ротової порожнини (гінгівіти, стоматити).

Противоказання.

Індивідуальна гіперчутливість до речовин, які містяться в лікарському засобі. Артеріальна гіпертензія.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не рекомендується застосування хворим, які приймають антикоагулянти, антибіотики, сульфаніламідні, протизапальні, гіпотензивні (блокатори кальцієвих каналів), гіпохолестеринемічні засоби (статиїни), жіночі статеві гормони, серцеві глікозиди.

Особливості застосування.

Хворим з артеріальною гіпертензією звіробою траву бажано призначати тільки у складі зборів.



Застосування у період вагітності або годування груддю.

Безпека та ефективність у період вагітності та годування груддю не вивчались, тому препарати звіробою внутрішньо не призначають.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Препарат звіробою у деяких пацієнтів може спричинити підвищення артеріального тиску, тому слід бути обережними при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Спосіб застосування та дози.

10 г (1,5 столової ложки) трави поміщають в емальований посуд, заливають 200 мл (1 склянка) гарячої кип'яченої води, закривають кришкою і настоюють на киплячій водяній бані 30 хв. Охолоджують при кімнатній температурі 10 хв, проціджують, залишок віджимають до процідженого відвару. Об'єм відвару доводять кип'яченою водою до 200 мл. Відвар приймають у теплому вигляді за 30 хв до їди. Дорослі та діти від 16 років приймають по 1/3 склянки 3 рази на день. Діти віком 12–14 років – по 1–2 столові ложки 2–3 рази на день. Діти віком 15–16 років – по 1/4 склянки 2–3 рази на день.

Зовнішньо відвар застосовують для полоскання ротової порожнини.

Перед застосуванням відвар рекомендується збовтувати.

Тривалість лікування визначається індивідуально з урахуванням перебігу захворювання, стабільності досягнутого терапевтичного ефекту і переносимості лікарського засобу.

Діти.

Протипоказане застосування дітям віком до 12 років.

Передозування.

Передозування та тривале застосування спричиняє відчуття гіркоти у роті, неприємні відчуття у ділянці печінки.

Побічні реакції.

Підвищення артеріального тиску; алергічні реакції (включаючи гіперемію, висипання, набряк та свербіж шкіри); фотосенсибілізація (під час лікування слід уникати УФ-опромінення).

Термін придатності. 3 роки.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Приготовлений відвар зберігати у прохолодному місці не більше 2 діб.

Зберігати в недоступному для дітей місці!

Упаковка.

По 75 г у пачці з внутрішнім пакетом.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник/заявник.

ТОВ «Тернофарм».

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності/ місцезнаходження заявника.

Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4.

Тел./факс: (0352) 521-444, <http://www.ternopharm.com.ua>.

Дата останнього перегляду.

Освал

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного досьє

Фекст узгоджено

