



## ЭХИНАЦЕИ НАСТОЙКА-ТЕРНОФАРМ

настойка

### ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

*Прочтите внимательно этот листок-вкладыш перед тем, как начать применение препарата!*

*Храните этот листок-вкладыш. Вам может понадобиться перечитать его снова.*

*Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим врачом.*

#### **Состав лекарственного средства.**

**основные физико-химические свойства:** жидкость красновато-коричневого цвета. В процессе хранения допускается образование осадка;

**международное непатентованное название:** отсутствует;

**действующие вещества:** 1 флакон содержит спиртовое извлечение эхинацеи пурпурной корневищ с корнями 1:10. Содержит не менее 45 % этилола.

**Лекарственная форма.** Настойка.

#### **Фармакотерапевтическая группа.**

Прочие иммуностимуляторы. Код ATC: L03AX.

**Фармакологические свойства.** Биологически активные вещества, содержащиеся в корневищах и корнях эхинацеи пурпурной, стимулируют неспецифическую иммунную систему (фагоцитоз макрофагов и активность естественных клеток-киллеров).

#### **Показания к применению.**

**Внутрь:** кратковременная профилактика и лечение в составе комплексной терапии острых респираторных заболеваний.

**Наружно:** применяется для лечения небольших поверхностных раневых повреждений.

#### **Противопоказания.**

Повышенная чувствительность к действующему веществу или другим растениям семейства астровых (сложноцветных). Прогрессирующие системные и аутоиммунные заболевания, в т. ч. туберкулез, саркоидоз, коллагенозы, рассеянный склероз, ВИЧ-инфекция или СПИД, хронические вирусные инфекции, распространенный атеросклероз, сахарный диабет, патология системы лейкоцитов (гемобластозы, агранулоцитоз и др.), онкологические заболевания, состояние иммунодефицита или иммуносупрессии, прием иммунодепрессантов (циклоспорина, метотрексата и др.), склонность к аллергическим реакциям.

Беременность, период лактации, детский возраст до 12 лет.

**С осторожностью:** детский возраст старше 12 лет, заболевания печени, алкоголизм, эпилепсия, черепно-мозговая травма и другие заболевания головного мозга со снижением судорожного порога.

#### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами.**

Вследствие иммуностимулирующего действия эхинацеи препарат может уменьшать эффективность препаратов, которые имеют иммунодепрессивное действие.

Препарат не рекомендуется применять одновременно с препаратами с гепатотоксичным действием, такими как амиодарон, метотрексат, кетоконазол, стероидные препараты.

Препарат содержит этиловый спирт. Необходимо избегать одновременного применения других лекарственных средств, содержащих этиловый спирт.

Взаимодействия, связанные с наличием в составе этилового спирта:

- лекарственные средства, вызывающие дисульфирамоподобную реакцию (ощущение жара, покраснение кожных покровов, рвота, тахикардия) при совместном приеме с алкоголем: дисульфирам, цефамандол, цефоперазон, латамоксифен, хлорамфеникол, хлорпропамид, глибенкламид, глипизид, толбутамид и другие гипогликемические препараты, гризоэофульвин, метронидазол, орнидазол, тинидазол, кетоконазол, прокарбазин.
- лекарственные средства, угнетающие функции центральной нервной системы.

### **Меры предосторожности.**

Пациентам с атопией в связи с риском развития анафилактических реакций перед применением лекарственного средства необходимо проконсультироваться с врачом.

Если во время приема лекарственного средства происходит ухудшение состояния или поднимается температура, необходимо обратиться к врачу. В случае появления признаков инфекции при лечении раневых повреждений необходимо обратиться к врачу.

Лекарственное средство содержит не менее 45 % (об/об) этанола, то есть не менее 323 мг на разовую дозу (20 капель).

### **Особенности применения.**

#### *Применение в период беременности или кормления грудью.*

В связи с отсутствием достаточных данных и содержанием этилового спирта применение настойки во время беременности и кормления грудью не рекомендовано. Настойку не следует наносить на молочную железу женщин, кормящих грудью.

#### *Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.*

Лекарственное средство содержит этиловый спирт! При приеме настойки следует отказаться от управления транспортными средствами и работы с потенциально опасными механизмами.

#### *Дети.*

В связи с отсутствием достаточных данных и содержанием этилового спирта применение настойки у детей до 12 лет не рекомендовано.

### **Способ применения и дозы.**

*Внутрь.* Разовая доза для взрослых 20 капель настойки, разведенных в 1/4 стакана воды, 3 раза в день. Детям старше 12 лет столько капель на прием, сколько лет ребенку, разведенных в 1/4 стакана воды, 3 раза в день за 30 минут до еды.

Для профилактики и лечения острых респираторных заболеваний лекарственное средство не следует использовать более 10 дней. При лечении острых респираторных заболеваний прием лекарственного средства следует начинать при первых признаках заболевания.

*Наружно.* При лечении раневых повреждений применяют наружно в виде примочек и компрессов. 20 - 60 капель настойки разводят в 100 мл изотонического раствора натрия хлорида, смачивают этим раствором марлю и накладывают ее на рану. Повязку меняют дважды в сутки. Продолжительность применения не должна превышать 7 дней.

Длительность курса лечения определяется врачом индивидуально для каждого пациента.


Не рекомендуется применять настойку в течение длительного времени из-за содержания этанола. Продолжительность применения у детей должна быть минимальной. Во время лечения необходимо избегать приема других этанолсодержащих средств.

Перед применением лекарственного средства флакон необходимо взбалтывать.

### **Передозировка.**

*Симптомы.* Тошнота, рвота, нарушение со стороны желудочно-кишечного тракта, повышенная возбудимость, нарушения сна.

*Лечение.* В случае появления симптомов передозировки необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу. При острой передозировке необходимо провести индукцию рвоты, промывание желудка. Симптоматическая терапия.



### **Побочные эффекты.**

*Аллергические реакции:* покраснение кожи, зуд, высыпания, крапивница, синдром Стивенса-Джонсона, ангионевротический отек, анафилактический шок, экзема, контактный дерматит).

Препараты эхинацеи могут вызвать развитие аллергических реакций у пациентов с атопией.

*Со стороны органов дыхания:* затруднение дыхания, бронхоспазм с обструкцией, астма.

*Со стороны центральной нервной системы:* головокружение.

*Со стороны сердечно-сосудистой системы:* артериальная гипотензия.

*Со стороны пищеварительного тракта:* тошнота, рвота, диарея.

Были отдельные сообщения о связи с аутоиммунными заболеваниями (диссеминированный энцефаломиелит, узловатая эритема, иммунотромбоцитопения, синдром Эванса, синдром Шегрена-Ларссона с нарушением тубулярной функции почек).

При длительном применении (более 8 недель) может возникнуть лейкопения.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в инструкции по применению, необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

### **Срок годности препарата.**

Срок годности – 2 года.

*Нельзя применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке!*

### **Условия хранения.**

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °C.

*Хранить в недоступном для детей месте.*

### **Упаковка.**

По 50 мл во флаконе стеклянном, укупоренном пробкой и крышкой. Каждый флакон стеклянный, вместе с листком-вкладышем и пробкой-капельницей, помещают в пачку из картона. По 50 мл во флаконе полимерном, укупоренном пробкой-капельницей и крышкой с контролем первого вскрытия. Каждый флакон полимерный, вместе с листком-вкладышем, помещают в пачку из картона.

### **Правила отпуска.**

Без рецепта.

### **Название и адрес производителя.**

ООО «Тернофарм».

Украина, 46010, г. Тернополь, ул. Фабричная, 4;

тел./факс (0352) 521-444, <http://www.ternopharm.com.ua>