


БОМ-БЕНГЕ МАЗЬ
мазь для наружного применения



ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

Прочтите внимательно этот листок-вкладыш перед тем, как начать применение препарата!

Храните этот листок-вкладыш. Вам может понадобиться перечитать его снова.

Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим врачом.

Состав лекарственного средства:

основные физико-химические свойства: мазь белого или белого с желтоватым оттенком цвета, с сильным специфическим запахом;

международное непатентованное название: отсутствует;

действующие вещества: 1 г мази содержит левоментола – 0,039 г, метилсалицилата – 0,202 г;

вспомогательные вещества: парафин, вазелин.

Лекарственная форма. Мазь для наружного применения.

Фармакотерапевтическая группа. Средства для местного применения при болях в суставах и мышцах. Лекарственные средства, содержащие производные салициловой кислоты. Код АТС M02A C.

Фармакодинамика. Метилсалицилат обладает противовоспалительным, обезболивающим, раздражающим и отвлекающим эффектами, в основе которых лежит влияние на повышенную проницаемость капилляров, процессы микроциркуляции, торможение активности медиаторов воспаления, в том числе применении способствует развитию обезболивающего эффекта.

Фармакокинетика. Данные по фармакокинетике отсутствуют.

Показания к применению. Для временного облегчения болей в суставах и мышцах (растяжения связок, ушибы), болей в пояснично-крестцовом отделе позвоночника (люмбаго, ишиас).

Противопоказания. Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. Детский возраст до 18 лет, беременность, период кормления грудью, повышенная чувствительность к ацетилсалициловой кислоте, нестероидным противовоспалительным средствам, бронхиальная астма, нарушение целостности кожных покровов, кожные заболевания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами. Метилсалицилат усиливает эффект антикоагулянтов, метотрексата при абсорбции, что следует учитывать при использовании больших доз препарата длительное время. Необходимо медицинское наблюдение за пациентами, принимающими антикоагулянтные лекарственные средства кумаринового типа и применяющими Бом-Бенге мазь. Перед применением препарата следует проконсультироваться с врачом, если Вы используете какие-либо другие препараты.

Меры предосторожности. Только для наружного применения!

Перед использованием попробуйте мазь на небольшом участке кожи. При нанесении на кожу лекарственное средство вызывает ощущение тепла или прохлады, не должны возникать боль или повреждение кожи. В случае возникновения боли, отека или высыпаний на коже необходимо прекратить применение препарата и немедленно

обратиться к врачу. После применения мазей, содержащих левоментол и метилсалицилат, были сообщения о развитии ожогов.

После нанесения мази не рекомендуется применять повязку, плотно прилегающую к коже и местное тепло (грелки, лампы, пакеты или бутылки с горячей водой) в связи с увеличением риска возникновения кожных реакций. Не допускать нанесения мази на раны, участки кожи с нарушением целостности кожного покрова или раздражением. Не допускать контакта мази с конъюнктивой глаз и слизистыми оболочками (полости рта, носа, половые органы).

При попадании в глаза и на слизистые оболочки промыть большим количеством чистой воды.

Руки после использования мази необходимо тщательно вымыть водой с мылом, если только они не являются объектом лечения.

Пациентам с повышенной чувствительностью не следует принимать горячий душ или ванну до или после применения мази.

Из-за опасности фотосенсибилизации избегать пребывания на солнце.

Если после применения мази улучшения не наступает или происходит рецидив заболевания, необходимо обратиться к врачу.

Не применять лицам, склонным к аллергическим реакциям на компоненты препарата.

Применение в период беременности или кормления грудью. Поскольку салицилаты проникают через плацентарный барьер, они могут оказать влияние на развитие плода и течение беременности/родов. При попадании в системный кровоток салицилаты проникают в молоко кормящих женщин. Применение лекарственного средства в период беременности и кормления грудью противопоказано.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами. Не влияет.

Дети. Препарат не применяют детям до 18 лет.

Способ применения и дозировка. Только для наружного применения. Не применять внутрь! При болях в мышцах и суставах следует нанести мазь на болезненный участок. При нанесении на кожу необходимо избегать травмирующих кожу движений. Применяют препарат до 3 раз в сутки. Продолжительность лечения определяется врачом и зависит от тяжести и течения заболевания.

Передозировка. Развитие передозировки возможно при нанесении мази на большие поверхности, участки поврежденной кожи или при случайном приеме мази внутрь.

При местном применении мази возможно усиление симптомов побочного действия. В случае приема мази внутрь необходимо немедленно обратиться к врачу.

Симптомы передозировки *метилсалицилата*: возбуждение, увеличение глубины дыхания, гиперпирексия.

Симптомы передозировки *левоментола*: тошнота, боль в животе, рвота, покраснение лица, головокружение, неуверенная походка, сонливость, дыхательные расстройства и кома.

Лечение симптоматическое.


Побочные эффекты. Возможны ожоги кожи, пузырьки и временные реакции со стороны кожи. Ощущение холода, затем теплоты, слабого жжения и покалывания, аллергические реакции, включая покраснения кожи, сыпь, крапивницу, контактный дерматит, зуд.

При появлении побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, необходимо прекратить применение мази и обратиться к врачу.

Срок годности препарата. Срок годности составляет 3 года.

Нельзя применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке!

Условия хранения. Хранить при температуре не выше 25 °С. *Хранить в недоступном для детей месте!*



Упаковка. По 25 г в тубе алюминиевой, помещенной вместе с листком-вкладышем в пачку из картона.

Правила отпуска. Без рецепта.

Название и адрес производителя.

ООО «Тернофарм».
Украина, 46010, г. Тернополь, ул. Фабричная, 4;
тел./факс +38 (0352) 521-444, www.ternopharm.com.ua