

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

КАМЕФЛЮ, аэрозоль для местного применения

Перед использованием лекарственного средства КАМЕФЛЮ Вы должны проконсультироваться с врачом.

Внимательно прочитайте весь листок-вкладыш перед тем, как начать прием/использование этого лекарственного средства, так как он содержит важную для Вас информацию.

Для достижения оптимальных результатов лекарственное средство следует использовать, строго выполняя все рекомендации, изложенные в инструкции (листочке-вкладыше).

Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, Вам понадобится прочесть его снова.

Если у вас возникли вопросы, обратитесь к врачу.

Обратитесь к врачу, если Ваше состояние ухудшилось или улучшение не наступило после проведенного лечения.

Это лекарственное средство прописано только Вам. Не передавайте его другим лицам.

Это может нанести им вред, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.

Название лекарственного средства.

Камефлю.

Форма выпуска.

Аэрозоль для местного применения.

Краткая характеристика готовой лекарственной формы.

КАМЕФЛЮ представляет собой прозрачную бесцветную жидкость, которая находится под давлением в баллоне с клапаном дозирующего действия и при выходе из баллона образует дисперсную струю с характерным ароматным запахом.

Состав лекарственного средства.

Один баллон содержит:

Действующие вещества: хлорбутанола гемигидрат – 0,1 г, камфора рацемическая – 0,1 г, левоментол – 0,1 г.

Вспомогательные вещества: масло эвкалиптовое, изопропилмирикат, хладон 134a.

Фармакотерапевтическая группа.

Средства для лечения заболеваний гортани и глотки. Антисептические средства.

Код АТС – R02A A20.


Показания к применению.

В комплексной терапии воспалительных заболеваний носа и верхних дыхательных путей.

Информация о правильном применении.

Противопоказания.

- возраст до 18 лет;
- лица с повышенной чувствительностью к компонентам препарата;
- эпилепсия, судороги в анамнезе (в том числе фебрильные), склонность к бронхоспазму, бронхиальная астма, коклюш.



Взаимодействие с другими лекарственными средствами.

Информация о случаях взаимодействия отсутствует.

Не рекомендуется применять одновременно с другими средствами для местного применения в полости носа и рта.

Информация об особенностях применения.

Перед применением Камефлю ротовую полость нужно прополоскать теплой кипяченой водой. Перед применением препарата в полости носа следует очистить нос от слизи.

Баллон с препаратом не разбирать и не давать детям, предохранять от ударов.

Перед применением препарата лицам, склонным к аллергии, нужно обязательно проконсультироваться с врачом. Не допускать попадания лекарственного средства в глаза. Если при применении лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Если Вы беременны или кормите грудью, если Вы предполагаете, что беременны или не исключаете у себя вероятности наступления беременности, сообщите об этом своему лечащему врачу.

В связи с отсутствием достаточных данных применение лекарственного средства беременным и кормящим женщинам не рекомендовано.

Дети.

В связи с отсутствием достаточных данных применять у детей не рекомендовано.

Влияние на способность управлять автомобилем или работать с механизмами.

Данные о влиянии на скорость реакций при управлении автотранспортом или другими механизмами отсутствуют.

Применение у лиц пожилого возраста.

Нет данных об особенностях применения препарата у данной категории пациентов.


Способ применения и дозы.

При заболеваниях верхних дыхательных путей аэрозоль необходимо распылять в полости носа (на глубине 0,5 см) или в полости рта путем нажатия на распылитель до упора. За одно применение у взрослых осуществляют по 2-3 распыления. Частота применения составляет 3-4 раза в сутки. Курс лечения – 5-14 дней.

Перед применением снять защитный колпачок, выходное отверстие распылителя направить в полость носа на глубину 0,5 см или на пораженный участок горла и нажать на основание распылителя сверху вниз. При применении препарата в полостях носа и рта следует задержать дыхание, а баллон держать вертикально так, чтобы распылитель находился сверху; нельзя пользоваться баллоном в перевернутом состоянии. После применения препарата на распылитель надеть защитный колпачок.

Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого терапевтического эффекта и переносимости препарата. Препарат не следует применять дольше 2 недель.

Если у Вас возникли сомнения или вопросы, обратитесь к своему лечащему врачу.



Передозировка.

Признаки острого отравления при попадании внутрь: тошнота, рвота, боли в желудке. Пострадавшему следует немедленно обратиться к врачу. Меры помощи при передозировке: удаление препарата из желудка и кишечника (промывание желудка, использование солевых слабительных, клизма, применение кишечных адсорбентов - активированного угля), симптоматическое лечение.

В случае передозировки при местном применении возможно усиление симптомов побочного действия.

Вдыхание больших доз ментола может привести к развитию головокружения, спутанности сознания, мышечной слабости, тошноты и двоения в глазах.

Побочные реакции.

Возможны аллергические (эритема, сыпь, зуд, крапивница, ангионевротический отек, анафилактический шок) и бронхоспастические реакции. У пациентов с повышенной чувствительностью возможно развитие ларингоспазма, бронхоспазма и апноэ.

Аллергические реакции на ментол могут сопровождаться развитием головной боли, брадикардии, мышечного тремора, атаксии, анафилактического шока и эритематозной кожной сыпи.

Иногда могут возникать реакции со стороны слизистых оболочек (ощущение жжения, сухости слизистой оболочки носоглотки, носа, появление язв в полости рта, отек в месте контакта).

При появлении побочных эффектов сообщите об этом лечащему врачу. Это касается всех возможных побочных эффектов, в том числе не описанных в данном листке-вкладыше.

Условия хранения и срок годности.

Хранить при температуре не выше 25 °С, в недоступном для детей месте. Предохранять от падений, ударов, воздействия солнечных лучей.

Срок годности – 2 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска. Без рецепта.

Упаковка.

По 30 г в баллонах аэрозольных алюминиевых с клапанами дозирующего действия. Каждый баллон с распылительной насадкой, защитным колпачком и листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Информация о производителе (заявителе).

ООО «Микрофарм», 61013, Украина, г. Харьков, ул. Шевченко, 20,
телефон: +38 (057) 714-24-22.