



TƏSDİQ EDİLMİŞDİR  
Azərbaycan Respublikası  
Səhiyyə Nazirliyi  
Farmakoloji və Farmakopeya  
Ekspert Surasının sadri

E.M. Agayev

"28" Octyebri 2019-cu il

Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat (xəstələr üçün)

## OKSOLİN MƏLHƏMİ yerli istifadə üçün məlhəm OXOLIN OINTMENT

### Tərkibi

*Təsiredirici maddə:* 1 q məlhəmin tərkibində 2,5 mq oksolin vardır.

*Köməkçi maddələr:* mineral yağı, aq yumşaq parafin.

### Təsviri

Ağ rəngdən sarı rəngə qədər məlhəmdir. Saxlanma müddəti ərzində çəhrayı çaların yaranması yolveriləndir.

### Farmakoterapeutik qrupu

Hiss orqanlarına təsir edən vasitələr. Virusəleyhinə vasitələr.

**ATC kodu:** S01AD.

### Farmakoloji xüsusiyyətləri

#### *Farmakodinamikası*

Preparat yerli istifadə zamanı qrip viruslarına və adenoviruslara virusid təsir göstərir.

#### *Farmakokinetikası*

Qrip virusunun (əsasən A2 tipli) hüceyrə membranının səthi ilə birləşmə sahəsini blokada edir, virusun hüceyrəyə nüfuz etməsinin qarşısını alır.

### İstifadəsinə göstərişlər

- Epidemiya zamanı qripin fərdi profilaktikası;
- virus rinitlərinin, rinokonyunktivitlərinin müalicəsi.

### Əks göstərişlər

Preparatin istenilən komponentinə qarşı yüksək həssaslıq.

### Xüsusi göstərişlər və ehtiyat tədbirləri

Məlhəm. Gözün selikli qişasına istifadə üçün nəzərdə tutulmayıb.

### Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri

Burun boşluğunun selikli qişasının mümkün quruluğu nəticəsində, preparati intra-nazal istifadə üçün adrenomimetik vasitərlə eyni vaxtda istifadə etmək olmaz.

## **Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi**

Hamiləlik və laktasiya dövründə preparatı, yalnız o zaman ehtiyatla istifadə etmək olar ki, ana üçün gözlənilən fayda dölə olan potensial riskdən üstün olsun.

## **Pediatriyada istifadəsi**

Oksolin məlhəminin uşaqlarda istifadəsinin təhlükəsizliyini və effektivliyini öyrənən tədqiqatlar aparılmamışdır.

## **Nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsiri**

Oksolin məlhəminin nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsiri barədə məlumat yoxdur.

## **İstifadə qaydası və dozasi**

Virus rinitlərinin müalicəsi və qripin profilaktikası məqsədilə preparat intranasal istifadə edilir. Virus rinitinin müalicəsi üçün preparat 3-4 gün ərzində sutkada 2-3 dəfə burunun selikli qişasına sürtülür. Epidemiya zamanı qripin fərdi profilaktikası məqsədilə preparati hər gün səhər və axşam burunun selikli qişasına sürtmək məsləhət görülür, eləcə də, qripli xəstə-lərlə mümkün kontaktdan bilavasitə əvvəl sutka ərzində istifadə edilməlidir.

## **Əlavə təsirləri**

Məlhəmdən istifadə zamanı bəzi hallarda, preparatın istifadə edildiyi nahiyyədə qısamüddəti yanma hissi, rinoreya müşahidə edilmişdir.

## **Doza həddinin aşılması**

Doza həddinin aşılması halları məlum deyil.

## **Buraxılış forması**

10 q məlhəm, altüminium tubda. 1 tub, içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya qablaşdırılır.

## **Saxlanma şəraitı**

2-8°C temperaturda, orijinal qutusunda və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır.

## **Yararlılıq müddəti**

2 il.

Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.

## **Aptekdən buraxılma şərti**

Reseptsiz buraxılır.

## **İstehsalçı**

“Ternofarm” MMC.

## **Ünvan**

Ukrayna, 46010, Ternopol ş., Fabričnaya k., 4.

Tel.:/Faks: (0352) 521-444.

<http://www.ternopharm.com.ua>