



TƏSDİQ EDİLMİŞDİR  
Azərbaycan Respublikası  
Səhiyyə Nazirliyi  
Farmakoloji və Farmakopeya  
Ekspert Şurasının sədri

E.M.Ağayev

17 mart

2025-ci il

Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat (xəstələr üçün)

**ÖSKÜRƏK ƏLEYHİNƏ TABLETLƏR-TERNOFARM** tabletlər  
COUGH TABLETS -TERNOPHARM

**Tərkibi**

*Təsiredici maddə:* 1 tabletin tərkibində narın toz şəklində 0,0067 q lansetşəkilli termopsis otu (*Herba Thermopsis lanceolata*), 0,25 q natrium hidrokarbonat vardır.

*Köməkçi maddələr:* talk, kalsium stearat, kartof nişastası.

**Təsviri**

Yaşılımtıl-boz rəngli və ya sarı-qonur rəngli yastı silindrik formalı, üzərində bölmə xətti olan, iti kənarlı tabletlərdir. Çillərin olması yolveriləndir.

**Farmakoterapevtik qrupu**

Öskürək və soyuqdəymə xəstəlikləri zamanı istifadə edilən kombinə olunmuş preparatlar.

**ATC kodu:** R05X.

**Farmakoloji xüsusiyyətləri**

Termopsis otu bəlgəmgətirici təsirə malikdir, mədənin selikli qişasının reseptorlarına mülayim qıcıqlandırıcı təsir göstərməklə, reflektor olaraq bronxial vəzilərin sekresiyasını yüksəldir.

Termopsis otunun tərkibində olan alkaloidlər (sitizin, metilsitizin, paxikarpin, anagirin, termopsin, termopsidin) tənəffüs mərkəzinə, yüksək dozalarda isə qusma mərkəzinə oyadıcı təsir göstərir.

Natrium-karbonat bronxial vəzilərin sekresiyasını stimullaşdırır, bəlgəmin özlülüyünün azalmasına səbəb olur.

**İstifadəsinə göstərişlər**

Yuxarı tənəffüs yollarının çətin xaric olan bəlgəmli öskürəklə müşayiət olunan xəstəliklərinin (traxeit, bronxit) kompleks müalicəsində istifadə edilir.

**Əks göstərişlər**

Preparatın istənilən komponentinə qarşı yüksək həssaslıq, mədə və onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliyinin kəskinləşmə fazası, qanhayırma.

**Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri**

Adsorbentlər, büzüsdürücü və bürüyücü vasitələr termopsis otunun tərkibində olan alkaloidlərin mədə-bağırsaq traktından sorulmasını azalda bilər. Preparatı tərkibində kodein olan və öskürəyi azaldan digər preparatlarla eyni vaxtda istifadə etmək olmaz.

Bəlgəmin parçalanmasını və onun çıxarılmasını yaxşılaşdırmaq üçün çox miqdarda isti maye qəbul etmək məsləhət görülür.

**Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi**

Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi əks göstərişdir.

**Pediatrilyada istifadəsi**

12 yaşa qədər uşaqlarda preparatın istifadəsi əks göstərişdir.

**Nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsiri**

Nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsirinə dair tədqiqat aparılmamışdır.

**İstifadə qaydası və dozası**

Böyüklərə preparat 3-5 gün ərzində, sutkada 3 dəfə 1 tablet təyin edilir.

12 yaşdan yuxarı uşaqlara 3-5 gün ərzində sutkada 3 dəfə ½ tablet təyin edilir.

**Əlavə təsirləri**

Preparata qarşı yüksək fərdi həssaslıq zamanı allergik reaksiyaların inkişafı, o cümlədən hiperemiya, səpki, qaşınma və dərinin şişməsi mümkündür. Yüksək dozaların qəbulu zamanı qusma baş verə bilər.

**Doza həddinin aşılması**

Ürəkbulanma, qusma, zəiflik, diareya, başgicəllənmə, soyuq tər, avazıma, selikli qışaların göyərməsi, ağır zəhərlənmələr zamanı şüurun pozulması, oyanıqlıq, hallüsinasiya, qıcolma mümkündür.

**Müalicəsi**

Mədənin yuyulması, duz tərkibli işlədicilər, aktivləşdirilmiş kömür, simptomatik terapiya.

**Buraxılış forması**

10 tablet, blisterdə. Müvafiq sayda blister və içlik vərəqə qrup qablaşmasında.

**Saxlanma şəraiti**

25°C-dən yüksək olmayan temperaturda, quru, işıqdan qorunan və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır.

**Yararlılıq müddəti**

4 il.

Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.

**Aptekdən buraxılma şərti**

Resepsiz buraxılır.

**İstehsalçı/Qeydiyyat vəsiqəsinin sahibi**

Ternopharm LTD, Ukraine.

4 Fabrychna Street, Ternopil, Ukraine.

Tel./Faks: (0352) 521-444.

[www.ternopharm.com.ua](http://www.ternopharm.com.ua)