



Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat (xəstələr üçün)

## ÖSKÜRƏKƏLEYHİNƏ TABLETLƏR-TERNOFARM tabletər COUGH TABLETS -TERNOPHARM

### Tərkibi

*Təsireddi maddə:* 1 tabletin tərkibində narın toz şəklində 0,0067 q lansetşəkilli termopsisotu (*Herba Thermopsisidis lanceolata*), 0,25 q natrium hidrokarbonat vardır.

*Köməkçi maddələr:* talk, kalsium stearat, kartof nişastası.

### Təsviri

Yaşılımtıl-boz rəngli və ya sarı-qonur rəngli yastı silindrik formalı, üzərində bölmə xətti olan, iti kənarlı tabletlərdir. Çillərin olması yolveriləndir.

### Farmakoterapevtik qrupu

Öskürək və soyuqdəymə xəstəlikləri zamanı istifadə edilən kombinəolunmuş preparatlar.

**ATC kodu:** R05X.

### Farmakoloji xüsusiyyətləri

Termopsisotu bəlgəmgətirici təsirə malikdir, mədənin selikli qişasının reseptorlarına mülayim qıcıqlandırıcı təsir göstərməklə, reflektor olaraq bronxial vəzilərin sekresiyasını yüksəldir.

Termopsisotunun tərkibində olan alkaloidlər (sitizin, metilsitizin, paxikarpin, anagirin, termopsin, termopsisidin) tənəffüs mərkəzinə, yüksək dozalarda isə qusma mərkəzinə oyadıcı təsir göstərir.

Natrium-karbonat bronxial vəzilərin sekresiyasını stimullaşdırır, bəlgəmin özlülüyünün azalmasına səbəb olur.

### İstifadəsinə göstərişlər

Yuxarı tənəffüs yollarının çətin xaric olan bəlgəmlə öskürəklə müşayiət olunan xəstəliklərinin (traxeit, bronxit) kompleks müalicəsində istifadə edilir.

### Əks göstərişlər

Preparatın istənilən komponentinə qarşı yüksək həssaslıq, mədə və onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliyinin kəskinləşmə fazası, qanhayxırma.

### Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri

Adsorbentlər, büzüsdürütü və bürüyücü vasitələr termopsisotunun tərkibində olan alkaloidlərin mədə-bağırsaq traktından sorulmasını azalda bilər. Preparati tərkibində kodein olan və öskürəyi azaldan digər preparatlarla eyni vaxtda istifadə etmək olmaz.

Bəğəmin parçalanmasını və onun çıxarılmasını yaxşılaşdırmaq üçün çox miqdarda isti maye qəbul etmək məsləhət görülür.

### **Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi**

Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi əks göstərişdir.

### **Pediatriyada istifadəsi**

12 yaşa qədər uşaqlarda preparatın istifadəsi əks göstərişdir.

### **Nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsiri**

Nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsirinə dair tədqiqat aparılmamışdır.

### **Istifadə qaydası və dozasi**

Böyüklərə preparat 3-5 gün ərzində, sutkada 3 dəfə 1 tablet təyin edilir.

12 yaşdan yuxarı uşaqlara 3-5 gün ərzində sutkada 3 dəfə  $\frac{1}{2}$  tablet təyin edilir.

### **Əlavə təsirləri**

Preparata qarşı yüksək fərdi həssaslıq zamanı allergik reaksiyaların inkişafı, o cümlədən, hiperemiya, səpki, qasıńma və dərinin şısməsi mümkündür. Yüksək dozaların qəbulu zamanı qusma baş verə bilər.

### **Doza həddinin aşılması**

Ürəkbulanma, qusma, zəiflik, diareya, başgicəllənmə, soyuq tər, avazima, selikli qışaların göyərməsi, ağır zəhərlənmələr zamanı şüurun pozulması, oyaniqliq, halüsinasiya, qıcolma mümkündür.

### **Müalicəsi**

Mədənin yuyulması, duz tərkibli işlədicilər, aktivləşdirilmiş kömür, simptomatik terapiya.

### **Buraxılış forması**

10 tablet, blisterdə. 1 blister, içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya qablaşdırılır

### **Saxlanma şəraiti**

25°C-dən yüksək olmayan temperaturda, quru, işıqdan qorunan və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır.

### **Yararlılıq müddəti**

4 il.

Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.

### **Aptekdən buraxılma şərti**

Reseptsiz buraxılır.

### **İstehsalçı**

“Ternofarm” MMC.

### **Ünvan**

Ukrayna, Ternopol ş., Fabričnaya k., 4.

Tel./Faks: (0352) 521-444.

[www.ternopharm.com](http://www.ternopharm.com)