

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного средства

БОЯРЫШНИКА НАСТОЙКА

Состав:

действующее вещество: настойка плодов боярышника (*Crataegi fructus*) (1:10) (экстрагент – этанол 70 %);

1 флакон содержит настойки плодов боярышника (*Crataegi fructus*) (1:10) (экстрагент – этанол 70 %) 25 мл;

вспомогательные вещества, кроме экстрагента, отсутствуют.

Лекарственная форма. Настойка.

Основные физико-химические свойства: жидкость красновато-коричневого цвета. В процессе хранения возможно выпадение осадка.

Фармакотерапевтическая группа. Средства, применяемые в кардиологии.

Код АТХ С01Е В04.

Фармакологические свойства.

Фармакодинамика. Биологически активные вещества, содержащиеся в плодах боярышника (флавоноиды, холин, ацетилхолин, дубильные вещества, фитостерины, тритерпеновые кислоты) усиливают кровообращение в коронарных сосудах и сосудах головного мозга, повышают чувствительность миокарда к сердечным гликозидам и уменьшают его возбудимость, что приводит к некоторому усилению сокращений сердечной мышцы.

Фармакокинетика. Препарат хорошо всасывается при приеме внутрь. Эффект наступает через 30 мин – 1 час.

Клинические характеристики.

Показания.

Функциональные расстройства деятельности сердечно-сосудистой системы (нейроциркуляторные дистонии), а также как вспомогательное лекарственное средство при легких формах нарушений сердечного ритма (мерцательная аритмия, пароксизмальная тахикардия).

Противопоказания.

Индивидуальная непереносимость компонентов препарата. Выраженная артериальная гипотензия и брадикардия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.

Препарат может усиливать действие сердечных гликозидов, снотворных, седативных, гипотензивных средств. Применение с солями алкалоидов не рекомендуется в связи с возможностью образования отрицательных комплексов. Не следует применять препарат вместе с цизапридом.

Особенности применения.

Препарат не рекомендуется применять во время еды, во избежание взаимодействия с компонентами пищи.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Поскольку в состав препарата входит этанол, настойку не рекомендуется применять женщинам в период беременности или кормления грудью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.

Нужно воздержаться от управления автотранспортом или работы с другими механизмами.

Способ применения и дозы.

Применять внутрь до еды.

Взрослым рекомендуется принимать по 20 капель настойки, детям в возрасте от 12 лет – из расчета 1 капля на 1 год жизни 3 раза на день к достижению стабильного лечебного эффекта (нормализация артериального давления, уменьшение сердцебиения).

Дети.

Поскольку в состав препарата входит этанол, настойку не рекомендуется применять детям в возрасте до 12 лет.

Передозировка.

При значительном превышении дозы возможно возникновение сонливости, брадикардия, снижение артериального давления, которые требуют прекращения приема препарата и проведения симптоматической терапии.

Побочные реакции.

Редко наблюдаются сонливость, значительное замедление сердечного давления, аллергические реакции (в т.ч. гиперемия, сыпь, зуд, отек кожи).

Срок годности. 4 года.

Условия хранения.

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка.

По 25 мл во флаконах-капельницах.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель/заявитель.

ООО «Тернофарм».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности.

ООО «Тернофарм».

Украина, г. Тернополь, ул. Фабричная, 4.