



TƏSDİQ EDİLMİŞDİR
Azerbaijan Respublikası
Səhiyyə Nazirliyi
Farmakoloji və Farmakopeya
Ekspert Şurasının sədri

E.M. Ağayev

2023-cü il

Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat (xəstələr üçün)

PROPOLİS TİKTURASI tinctura PROPOLIS TINCTURE

Beynəlxalq patentləşdirilməmiş adı: Propolis tincture

Tərkibi

Təsireddi maddə: 1 flakonun içərisində 25 ml propolis tincturası (propolisi tinctura) (1:10) (ekstragent – 80 %-li etanol) vardır.

Köməkçi maddələr: ekstragentdən əlavə köməkçi maddə mövcud deyil.

Təsviri

Sarımtıl-qonur rəngdən qırmızı-qonura qədər rəngli, spesifik qoxuya malik mayedir. Preparatın saxlanması müddətində çöküntünün əmələ gəlməsi mümkündür.

Farmakoterapeutik qrupu

Yaraların və xoralı zədələnmələrin müalicəsi üçün istifadə olunan preparatlar. Yaraların sağalmasına səbəb olan preparatlar.

ATC kodu: D03AX.

Farmakoloji xüsusiyyətləri

Farmakodinamikası

Propolis (arı yapışqanı) – arıların həyat fəaliyyətinin məhsuludur, tərkibində bir sıra biogen maddələr – efir yağları, qətran qarışqları, mum, flavonoidlər, flavonlar, darçın turşusunun törəmələri vardır. Mikrob əleyhinə və iltihab əleyhinə aktivlik nümayiş etdirir, regenerasiya (zədələnmiş toxumaların bərpa olunması) proseslərini sürətləndirir.

Farmakokinetikası

Öyrənilməmişdir.

İstifadəsinə göstərişlər

Mikrotravmalar, dəri və selikli qişalar üzərində səthi zədələnmələr, otit, faringit, tonzillit, haymorit, parodontit.

Əks göstərişlər

Propolisə qarşı yüksək həssaslıq və ya fərdi dözümsüzlük, xüsusiylə, qaraciyər və ya böyrək xəstəlikləri qeyd olunan pasientlərdə, ekzema, allergik reaksiyalar (xüsusiylə, arıcılıq məhsullarına qarşı reaksiyalar), dərinin və selikli qişaların zədələnmiş sahələrindən qanaxma.

Xüsusi göstərişlər və ehtiyat tədbirləri

Preparatın istifadəsinə başlamazdan əvvəl həkimlə məsləhətləşmək lazımdır.

Preparatın istifadəsi müddətində ağrılaşmaların meydana çıxması ehtimal edilir və bu səbəbdən, pasiyentlər ağrılaşmaların inkişaf etməsi barədə məlumatlandırılmalıdır. Propolisə qarşı dözümsüzlük simptomları preparatın istifadəsindən dərhal sonra və ya bir neçə saat və hətta bir neçə sutka sonra meydana çıxa bilər. Bəzi pasiyentlərdə onlar yalnız təkrar müalicə kursu müddətində inkişaf edir.

Pediatriyada istifadəsi

Preparat 3 yaşdan yuxarı uşaqlarda istifadə edilə bilər.

Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri

Preparatın digər antiseptik preparatlarla və ya arıcılıq məhsulları ilə eyni zamanda istifadəsi tövsiyə olunmur. Hər hansı digər dərman preparatları ilə eyni zamanda istifadəsi üçün zərurət yarandığı halda, həkimlə məsləhətləşmək lazımdır.

Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi

Hamiləlik və ya laktasiya dövründə göstərilən dərman preparatının istifadəsi tövsiyə olunmur.

Nəqliyyat vasitəsini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsiri

Heç bir təsir göstərmir.

İstifadə qaydası və dozası

Propolis tinkturası böyüklerdə və 3 yaşdan yuxarı uşaqlarda applikasiyalar şəklində, yaxalayıcı və yuyucu məhlullar şəklində və eləcə də, inhalyasiyalar şəklində yerli istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Mikrotravmalar və dərinin irinli zədələnmələri qeyd olunduğu hallarda, propolis tinkturası sutkada 1-3 dəfə zədələnmiş nahiyyəyə tampon vasitəsi ilə çəkilə bilər.

Xarici irinli otitin müalicəsi müddətində xarici qulaq yuyulduğandan sonra qulağa propolis tinkturası ilə isladılmış tampon (sutkada 2-3 dəfə 1-2 dəqiqəlik) yeridilməlidir və ya sutkada 3-4 dəfə 1-2 damcı propolis tinkturası damızdırılmalıdır.

Xroniki tonsillit və faringit zamanı selikli qışalara preparat 8-15 gün müddətində sutkada 1-2 dəfə çəkilməlidir. Bundan əlavə, tonsillit zamanı propolis tinkturası 1:20-yə nisbətində spiriti-sulu inhalyasion məhlulun hazırlanması üçün istifadə edilə bilər. İnhalyasiya sutkada 1-2 dəfə həyata keçirilməlidir, müalicə kursu 7-10 gün davam etdirilməlidir.

Xroniki haymorit zamanı haymor boşluqları 2 həftə müddətində sutkada 2 dəfə propolis tinkturasından və 0,9%-li natrium xlorid məhlulundan (1:10-na nisbətində) hazırlanmış məhlul ilə yuyulmalıdır.

Parodontoz zamanı propolis tinkturası turundalarda 5 dəqiqə müddətində parodontal ciblərə yeridilməlidir.

Səthi eroziyalar və ağız boşluğu selikli qışasının zədələnmələri zamanı 15 ml propolis tinkturası 1/2 stəkan ılıq suda həll edilərək hazırlanmış yaxalayıcı məhlul şəklində 3-4 gün müddətində sutkada 4-5 dəfə istifadə edilməlidir. Müalicə kursunun davametmə müddəti həkim tərəfindən fərdi qaydada müəyyən edilir.

Əlavə təsirləri

Adətən istifadə edilən terapevtik dozalarda preparat toksik deyildir və pasiyentlər tərəfindən yaxşı keçirilir. Əlavə reaksiyalar nadir hallarda inkişaf edir.

Ehtimal edilən əlavə reaksiyalara aşağıda göstərilənlər aididir:

Dəridə və dərialtı toxumalarda baş verən pozğunluqlar: övrə, dəri üzərində yerli qaşınma, yerli ödəm, dərinin qızarması, suluqların əmələ gəlməsi, vezikulyar səpgilər, dəridə, xüsusi lə, əllərin üzərində və preparatla kontaktda olan bədənin digər nahiyyələrində quruluq və çatların əmələ gəlməsi.

Mərkəzi sinir sistemində baş verən pozğunluqlar: başgicəllənmə.

İmmun sistemdə baş verən pozğunluqlar: allergik reaksiyalar, o cümlədən, allergik dermatit, hiperemiya, dəri üzərində qaşınma, səpgilər, larinqospazm, təngnəfəslik, Kvinke ödəmi, bədən temperaturunun yüksəlməsi.

Mədə-bağırsaq traktında baş verən pozğunluqlar: ürəkbulanma.

Tənəffüs sistemi orqanlarında baş verən pozğunluqlar: təngnəfəslilik.

Dil üzərində yanğı hissi, ağızda quruluq şəklində meydana çıxan yerli reaksiyalar inkişaf edə bilər.

İstənilən arzuolunmayan reaksiyalar meydana çıxdığı halda, preparatın istifadəsi dayandırılmalıdır və mütləq həkimə müraciət edilməlidir.

Arzuolunmayan reaksiyalar barədə məlumatlar

Hər hansı əlavə reaksiyalar, o cümlədən həmin içlik vərəqədə qeyd edilməyən istənilən əlavə reaksiyalar meydana çıxarsa, bu barədə həkimə və ya əczaçıya məlumat vermək lazımdır.

Dərman preparatlarının istifadəsi müddətində meydana çıxan arzuolunmayan reaksiyalar barədə Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Analitik Ekspertiza Mərkəzinə aşağıda göstərilən ünvana məlumat verilməlidir:

AZ 1065, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh., C. Cabbarlı küç., 34.

Faks: (+99412) 596-07-16.

Email: adr@pharma.az.

Telefon: (+99412) 596-05-20.

Qaynar xətt: (+99412) 596-07-12.

Arzuolunmayan reaksiyalar barədə məlumat verməklə, göstərilən dərman preparatının təhlükəsizliyi barədə daha çox məlumatın toplanmasına kömək etmək olar.

Doza həddinin aşılması

Simptomları: iştahanınitməsi, orqanizmin ümumi tonusunun zəifləməsi, əzginlik, dəri üzərində səpgilərin meydana çıxməsi.

Müalicəsi: antihistamin dərman preparatları ilə müalicə təyin edilməlidir.

Buraxılış forması

25 ml tinktura, damcısalan-flakonda.

Saxlanması şəraiti

25° C-dən yuxarı olmayan temperaturda, orijinal qablaşmadada və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır.

Yararlılıq müddəti

3 il.

Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.

Aptekdən buraxılma şərti

Reseptsiz buraxılır.

İstehsalçı/Qeydiyyat vəsiqəsinin sahibi

“Ternofarm” MMC.

Ukrayna, 46010, Ternopol şəh., Fabriçnaya küç., 4.

Tel./Faks: +38 (0352) 521-444.

www.ternopharm.com.ua