

УТВЕРЖДЕНА
Приказом председателя
Комитета контроля медицинской и
фармацевтической деятельности
Министерства здравоохранения СР
Республики Казахстан
от "19" 05 2017 г.
№ N008328

**Инструкция
по медицинскому применению лекарственного средства
ПРОПОСОЛ-Н**

Торговое название

Пропосол - Н

Международное непатентованное название

Нет

Лекарственная форма

Спрей для местного применения, 20 г

Состав

1 баллон содержит

активное вещество: прополис 1,2 г

вспомогательные вещества: этанол 96%, глицерин.

Описание

Коричневая или от жёлто-коричневого до красно-коричневого цвета жидкость с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Противомикробные препараты для местного лечения заболеваний полости рта. Прочие.

Код АТХ A01A B 11.

Фармакологические свойства

Фармакокинетика

Пропосол-Н в течение 2- 4 минут всасывается слизистой оболочкой ротовой полости и проявляет местное резорбтивное лечебное действие.

Фармакодинамика

Действующее вещество прополис содержит комплекс биологически-активных природных соединений (флавоноиды, аминокислоты, смолы, органические кислоты, эфирные масла, витамины, микроэлементы). Прополис обладает выраженными антимикробными



противовоспалительными, репаративными и антиоксидантными свойствами, что обеспечивает лечебное действие пропосола при катаральных, афтозных, язвенных стоматитах, катаральных гингивитах, глосситах, пародонтозах. Кроме того, в состав спрея введен глицерин и этанол, которые также проявляют терапевтический эффект – смягчающий и антисептический. Комбинация указанных фармакологических свойств обеспечивает комплексную патогенетическую терапию воспалительных заболеваний слизистой оболочки ротовой полости. Не оказывает местно-раздражающего и общетоксического действия на организм.

Показания для применения

Предназначен для местного лечения воспалительных заболеваний слизистой оболочки ротовой полости: афтозных, катаральных, язвенных стоматитов, катаральных гингивитов, глосситов, пародонтозов.

Способ применения и дозировка

Перед использованием Пропосола-Н на аэрозольный баллон необходимо надеть распылительную насадку, несколько раз встряхнуть баллон, после чего путем нажатия насадки до упора равномерно оросить препаратом пораженный участок слизистой оболочки полости рта. Препарат применяют 2-6 раз в день, а после уменьшения воспалительного процесса – 1-2 раза в день до полного выздоровления. Курс лечения составляет 7-10 дней.

Детям старше 12 лет применяют с осторожностью.

Побочные действия

- аллергические реакции (покраснение, зуд кожи, ангионеврический отёк в местах контакта с препаратом).

Противопоказания

- индивидуальная повышенная чувствительность
- остшая экзема
- детский возраст до 12 лет

Лекарственные взаимодействия

Не установлены

Особые указания

Перед применением Пропосола-Н ротовую полость необходимо прополоскать теплой кипяченой водой. После орошения ротовой полости Пропосолом-Н желательно не употреблять пищу в течение 15-30 минут.

Во избежание закупорки отверстия распылителя по окончании манипуляции его необходимо продуть или поместить в стакан с чистой водой! При использовании баллон следует держать строго вертикально!



Избегать попадания препарата в глаза. В случае попадания в глаза промыть большим количеством воды.

Применение в период беременности и лактации

Поскольку препарат содержит этиловый спирт, с осторожностью назначают беременным женщинам и в период кормления грудью.

Особенности влияния препарата на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами

Следует воздержаться от управления транспортными средствами или работы с потенциально опасными механизмами (из-за наличия в составе препарата этилового спирта).

Передозировка

Симптомы: возможны аллергические реакции

Лечение: отмена препарата. Симптоматическая терапия

Форма выпуска и упаковка

По 20 г в баллоны аэрозольные моноблочные алюминиевые с внутренним фенольно-эпоксидным защитным покрытием вместимостью 31 мл с механическими насосами, снабженные горловыми насадками (распылителями) и предохранительными колпачками.

На баллон методом трафаретной печати краской наносят текст или наклеивают этикетку из материала для этикеток самоклеющихся.

По 1 баллону с распылителем, предохранительным колпачком и инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках помещают в пачку из картона для потребительской тары.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок хранения

2 года

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Без рецепта

Производитель

ООО «Микрофарм», 61013, Украина, г. Харьков, ул. Шевченко, 20

Держатель регистрационного удостоверения

ООО «Микрофарм», Украина

Адрес организации, принимающей на территории Республики Казахстан претензии от потребителей по качеству продукции (товара),



ответственной за пострегистрационное наблюдение за безопасностью лекарственного средства:

г. Алматы, мкрн Айнабулак-1, дом 17, тел. +7 (727) 34 94 431, сот. 8 747 0126972



згідно з орнігіналу
Холостов В.В.
Хол