

TƏSDİQ EDİLMİSDİR
Azərbaycan Respublikası
Səhiyyə Nazirliyi
Farmakoloji və Farmakopeya
Ekspert Surasının sədri


E.M. Ağayev
"16" İyun 2019-cu il

Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat (xəstələr üçün)

DAMOTU TİNKTURASI
LEONURI TINCTURA

Tərkibi

Təsiredici maddə: 1 flakonda 25 ml damotu tinkturası (tinctura herbae Leonuri) (1:5)
(ekstragent: 70%-li etanol) vardır.

Təsviri

Yaşılımtıl qonur rəngli, zəif ətir qoxulu mayedir. Saxlanma dövründə çöküntünün yaranması mümkündür.

Farmakoterapevtik qrupu

Yuxugətirici və sedativ vasitə.

ATC kodu: N05CM.

Farmakoloji xüsusiyyətləri

Farmakodinamikası

Təsir xarakterinə görə damotu tinkturası pişikotu preparatlarına bənzərdir. Sakitləşdirici effekti tormozlanma prosesinin güclənməsinə və ya mərkəzi sinir sistemində oyanma proseslərinin zəifləməsi hesabına baş verir. Yuxugətirici təsir göstərmir, lakin fizioloji yuxunun gəlməsini yüngülləşdirir və onu dərinləşdirir. Vərdişolma, psixi asılılıq yaratmır.

Farmakokinetikası

Öyrənilməyib.

İstifadəsinə göstərişlər

Ürək-damar sisteminin fəaliyyətinin funksional pozulmaları (hipertonik tip üzrə neyrosirkulyator distoniya), arterial hipertenziyanın ilkin mərhələsi, eləcə də, yüksəlmiş emosional oyanıqlıq, qıcıqlanma, yuxunun pozulmasının yüngül formaları.

Əks göstərişlər

Preparatın istənilən komponentinə qarşı yüksək həssaslıq.

Xüsusi göstərişlər və ehtiyat tədbirləri

Preparatın tərkibində etanol vardır. Preparatı uzun müddət istifadə etmək olmaz.

Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri

Damotu tinkturası sedativ, yuxugətirici, analgetik, antihipertenziv preparatların və ürək qlikozidlərinin effektini, eləcə də, alkoqolun təsirini gücləndirə bilər.

İstənilən digər dərman vasitələrilə eyni vaxtda qəbulu zamanı həkimə məlumat vermək lazımdır.

Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi

Preparatın tərkibində etanol olduğu üçün tinkturanı hamiləlik və laktasiya dövründə istifadə etmək olmaz.

Pediatrilyada istifadəsi

Preparatın tərkibinə etanol daxil olduğu üçün onun 12 yaşa qədər uşaqlarda istifadəsi məsləhət görülmür.

Nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsiri

Damotu tinkturasının qəbulu zamanı nəqliyyat vasitəsini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarə etməkdən çəkinmək lazımdır.

İstifadə qaydası və dozası

Damotu tinkturası yeməkdən sonra daxilə qəbul edilir. Həkim digər müalicə sxemi təyin etmədikdə, böyüklərə gündə 3-4 dəfə 30-50- damcı stabil müalicəvi effekt əldə edilənə qədər istifadə etmək məsləhət görülmür, 12 yaşdan yuxarı uşaqlara hər yaşa 1 damcı hesabı ilə sutkada 3-4 dəfə təyin edilir. Müalicə kursu hər bir pasiyentə patoloji prosesin xarakterindən, ağırlıq dərəcəsinə, xəstəliyin gedişinin xüsusiyyətinə, preparata qarşı dözümlüliyindən və əldə edilən müalicəvi effektin stabilliyindən asılı olaraq fərdi müəyyən edilir.

Əlavə təsirləri

Yüksək həssaslıq zamanı yerli allergik reaksiyaların (o cümlədən, dərinin qızarması və ödem, səpgi, qaşınma), eləcə də, başgicəllənmə, yuxululuq, yorğunluq hissi, əqli və fiziki iş qabiliyyətinin azalması mümkündür.

Doza həddinin aşılması

Məsləhət görülmən doza həddi aşıldıqda, başgicəllənmə, yuxululuq, arterial təzyiqin enməsi müşahidə edilə bilər. Doza həddinin aşılması halında preparatın qəbulunu dayandırmaq və dərhal simptomatik tədbirlər və dəstəkləyici terapiya (pasiyentin klinik vəziyyətinə uyğun olaraq) tətbiq etmək lazımdır.

Preparata qarşı yüksək həssaslığın inkişafı mümkündür.

Buraxılış forması

25 ml məhlul, damcıladıcısı olan şüşə flakonda.

Saxlanma şəraiti

25°C-dən yüksək olmayan temperaturda, orijinal qablaşdırmada və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır.

Yararlılıq müddəti

4 il.

Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.

Aptekdən buraxılma şərti

Resepsiz buraxılır.

İstehsalçı/Ərizəçi

“Ternofarm” MMC.

Ünvan

Ukrayna, Ternopol ş., Fabriçnaya k., 4.

Tel./Faks: +38 (0352) 521-444.

www.ternopharm.com.ua