

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
05.06.2011 № 1071
Реєстраційне посвідчення
№ UA/8722/01/01

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу
ДЕНТА КРАПЛІ

Склад:

діючі речовини: хлоралгідрат, камфора рацемічна;
1 мл препарату містить хлоралгідрату 333 мг, камфори рацемічної 333 мг;
допоміжна речовина: етанол 96 %.

Лікарська форма. Розчин зубний.

Основні фізико-хімічні властивості: безбарвна прозора рідина з запахом камфори.

Фармакотерапевтична група.

Засоби для місцевого застосування у стоматології.

Код ATХ A01A D11.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Лікарський засіб чинить помірну знеболювальну та антисептичну дію, зумовлену фармакологічними властивостями речовин, що входять до його складу.

Фармакокінетика. Не вивчалась.

Клінічні характеристики.

Показання.

Зубний біль при карієсі, в тому числі ускладненому пульпітом.

Протипоказання.

Підвищена індивідуальна чутливість до речовин, які входять до складу препарату, схильність до судомних нападів, бронхіальна астма.

Уникати контакту розчину з ушкодженою слизовою оболонкою.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Взаємодія поки що не відома.

Особливості застосування.

Прияві будь-якої небажаної реакції слід припинити застосування препарату і змити його залишки з місць застосування.

Застосування у період вагітності або годування грудлю.

Оскільки лікарський засіб містить етанол, його не можна призначати вагітним та жінкам, які годують грудлю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Препарат впливає на швидкість психомоторних реакцій, тому на період лікування слід уникати керування автотранспортом або роботи з іншими механізмами.

Спосіб застосування та дози.

Застосовувати дорослим.

Для усунення зубного болю ватний тампон, змочений 2–3 краплями препарату, закладати у каріозну порожнину зуба на 5–10 хв.

Діти.

Препарат не застосовувати для лікування дітей.

Передозування.

При випадковому потраплянні внутрішньо можливі біль у животі, нудота, блювання, діарея, симптоми пригнічення центральної нервої системи, запаморочення, атаксія, судоми, припливи, сонливість, утруднення дихання. Лікування симптоматичне.

Побічні реакції.

З боку нервої системи: запаморочення, сонливість, головний біль, збудження, судоми.

З боку дихальної системи, органів грудної клітки: бронхоспазм.

Алергічні реакції, включаючи шкірні висипи, крапив'янку, свербіж, еритему.

Термін придатності. 4 роки.

Умови зберігання.

Зберігати у захищенному від світла місці при температурі не вище 25 °C.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 10 мл у флаконах в пачці або без пачки, або по 20 мл у флаконах-крапельницях в пачці або без пачки.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник/заявник.

ТОВ «Тернофарм».

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності/
місцезнаходження заявитика.

ТОВ «Тернофарм».

Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4.

Дата останнього перегляду.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного досьє

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного досьє