

БЕКИТЕМ

Кыргыз Республикасынын
 Саламаттык сактоо министрлигинин
 Дары-дармектер жана медициналык
 техникалар менен камсыздандыруу
 департаментинин директорунун
 бириңчи орун басары
 Дүйшеналиев Н. К.

«27» апрель 2018 - ж.



ДАРЫ КАРАЖАТЫН МЕДИЦИНАЛЫК КОЛДОНУУ БОЮНЧА НУСКАМА

ИНГАЛИПТ-Н

Соодадагы атальышы
ИНГАЛИПТ-Н

Эл аралык патенттелбegen атальышы
Жок

Курамы

1 баллон төмөнкүлөрдү камтыйт

Таасир берүүчү зам: эриген стрептоцид 0,75 г, норсульфазол натрий 0,75 г;

Көмөкчү заттар: тимол, эвкалипт майы, ачуу жалбыз майы, этанол 96%, сахароза, глицерин, полисорбат 80, тазаланган суу.

Дарынын түрү

Жергиликтүү колдонуу үчүн спрей.

Сүрөттөмөсү

Ачык сарыдан каралжын-сары түскө чейин, өзгөчө жыт менен тунук суюктук.

Фармадарылык тобу

Респиратордук системага таасир эткен каражаттар. Тамак ооруларында колдонулган дарылар. Антисептиker. Ар кандай антисептиker.

ATX коду R02A A20.

Фармакологиялык касиеттери

Фармакодинамикасы

Ингалипт-Н бактерияларга каршы жана сезгенүүгө каршы таасир этет, ошондой эле

муздатуучу жана көнүлдү башкага буруучу таасирге ээ. Көрсөтүлгөн фармакологиялык касиеттердин байланышы комплекстүү үстүнкү дем алуу жолдорунун жана ооз көндөйүнүн былжырлуу кабыгын сезгенүү дарттарынын комплекстүү патогенетикалык терапиясын камсыз кылат. Ингалипт-Н организмге ульцерогендик жана жалпы уулдуу таасир этпейт.

Фармакокинетикасы

Ингалипт-Н жергиликтүү пайдалануу үчүн арналган жана терапиялык концентрациясы негизинен сезгенүү очогунда түзөт. Системалуу кан агымына жарым-жартылай сульфаниламииддер сицирилет (стрептоцид эритме жана норсульфазол натрий), алар кайрылуу түрүндө кандын белоктору менен байланышшат: эриме стрептоцид – 12-14 %га, норсульфазол натрий – 55 %га. Биотрансформация процессинде сульфаниламииддердин ацетилизацияланган формалары түзүлөт, ушундай түрдө алар бөйрөктөр менен бөлүнүп чыгарылат. Стрептоциддин жарым-жартылай бөлүнүп чыгуу мезгили 10 саатты, норсульфазола натрий – 1,2 саатты түзөт.

Колдонууга көрсөтмөлөр

КТМ органдарынын жана ооз көндөйүнүн былжырлуу кабыгынын инфекциялык-сезгенүү дарттарын (тонзиллит, фарингит, ларингит, афтоздук жана жара оозулдары) жергиликтүү дарылоо.

Колдонуу жолу жана дозалар

3 жаштан баштап балдар жана чондор үчүн жергиликтүү түрдө ооз көндөйүнүн мурун-кулкун көндөйүнүн былжырлуу кабыктарына жергиликтүү түрдө, чачуу аркылуу пайдалануу.

Чондорго чачууну суткада 3-4 жолу жүргүзүү сунушталат.

3 жаштан баштап балдар үчүн чачууну суткада 1-2 жолу, эгер дарыгердин өзгөчө көрсөтмөсү жок болсо.

Дарыны колдонуунун узактыгы оорунун жүрүшүнөн көз каранды жана кадыресе 3-10 сутканы түзөт.

Колдонуу жышиштыгы жсана узактыгы дарыгер тарабынан жекече аныкталат жсана оорунун оордугунан көз каранды!

Баллонду колдонуу эрежеси.

1. Баллондон коргоочу капкакчаны алуу керек.
2. Баллонго алдын ала тазалыгын текшерүү менен коштолгон тамак үчүн саптоону (сепкич) кийгизүү керек.
3. Баллонду бир нече чолу чайкал, дисперсиялык агындын пайда болушуна чейин 7ден ашык эмес жолу басыш керек. Агын жок болсо, аракетти дагы бир жолу кайталоого уруксат берилет.
4. Сепкичтин бош учун ооз көндөйүнө салып, баллонду вертикалдуу кармап, сепкичтин башына басуу керек. Бир сеанста Ингалипт-Н дарысын 2-3 жолу себүү зарыл.
5. Чачканды аяктагандан кийин, сепкичи баллондун штогунан альп, коргоочу капкагы менен алдын ала тазалыгын текшерип жаап коюу керек.
6. Сепкичти таза кармаш керек, колдонгондон кийин аны жылуу сууга андан аркы жылуу жерде кургаттуу менен жууп тазалоо зарыл.

Каршы көрсөтмөлөр

Дарынын курам бөлүктөрүнө жогорку сезимталдык, таржымалында сульфаниламииддерге оор уулдуу аллергиялык реакциялардын болушу.

Кыйыр реакциялар

Аллергиялык реакциялар, анын ичинде тери бөртмөлөрү, кычышуу, тийишен жерлерде шишимик, тамыр нерв шишимиги, бронхкарышуусу, бөрү жатыш.

Эрежеге ылайык дары жакшы көтөрүлөт, бирок кээ бир учурда кыйыр реакциялар болушу ыктымал.

Иммундук системасы тарабынан: аллергиялык реакциялар, анын ичинде тамыр нерв шишимиги, бронхкарышуусу.

Тери тарабынан: чыбырчыктоо, кычышуу, бөрү жатыш, тийишен жерде шишимик.

Тамак сиңирүү системасы тарабынан: жүрөк айлануу, кусуу, жергилиттүү эффекттер (ооздо зарна, тамакта кесек бир нерсе тургандай сезим же кычышып ачышуу).

Башка: жалпы алсыздык, кыйналыш дем алуу.

Кайсы бир жасагымсыз таасирлер же башкача реакциялар пайда болсо, андан ары дарыны пайдалануу боюнча дарыгер менен кеңешүү керек.

Башка дары каражаттары менен өз ара таасири жана башка өз ара таасирдин турлөрү

Эгер сиз башка кайсы бир дары каражаттарын кабыл алыш жасатсаңыз, сөзсүз дарыгер менен мындан аркы дарыны колдонуу мүмкүнчүлүгү боюнча кеңешиңиз!

Дарыны парааминобензой кычкылдыгынын туундуларынын каражаттары (новокаин, аnestезин, дикаин) менен бирге колдонууда анын микробго каршы таасири азайышы ыктымал.

Өзгөчө көрсөтмөлөр

Дарыны аллергияга көп кабылган тараптар колдонуудан мурун дарыгер менен кеңешүү зарыл!

Дарыгер менен кеңешпестен дарыны көрсөтүлгөн мөөнөттөн ашик колдонууга болбойт!
Мидёттүү турдө дарыгерге бул топтогу дарыларды кабыл алууга карата мурун табылган жасагымсыз таасирлерди билдируү керек.

Дарынын көздөргө кирип кетишинен сак болуу керек.

Бириңчи колдонуудан мурун дисперсиялык ағындын пайда болушуна чейин 7ден көп жолу баспагыла. Ағын жок болсо, аракетти дагы бир жолу кайталоого уруксаат берилет. Колдонуудан мурун ооз көндөйүн жылуу кайнатылган суу менен чайкоо сунушталат. Ооз көндөйүнүн жаракаттанган бөлүктөрү (жаралар, жооруулар) болсо, зыянсыздандырылган тампондордун жардамы менен некроттук өңөрлердү алыш салуу керек.

Ооз көндөйүнө чачкандан кийин 15-30 мунөт тамак ичпөө сунушталат.

Каражатты пайдалангандан кийин тамак сепкичин штоктон алыш, аны жылуу суу менен жууш керек. Баллонду коргоочу капкак менен анын булганышын алдын алуу үчүн жаап коюу сунушталат.

Дарыны балдарда колдонууда 1-2 чачууда чачылган дарынын бир жолку дозасы 0,0076-0,0152 мл этанолду (96 %) камтыганын эске алуу керек, ал бир жолку кабыл алууда төмөнкү көрсөткүчтөрдөн түзүлөт: 3-5 жаштагы (дene салмагы 15-21 кг) балдар учун 0,0004-0,0013 мл/кг, 6-12 жаштагы (дene салмагы 21-38 кг) балдар учун 0,0002-0,0007 мл/кг.

Бул дары каражаты сахарозаны камтыгандыктан, сейрек кездешүүчү тукум кууган фруктозаны көтөрө албастык, глюкоза-галактоза мальабсорбциясы же сахароза-изомальтоза жетишсиздиги менен бейтаптарга бул дарыны колдонуу сунушталбайт.

Кош бойлуулук же эмизүү мезгилинде колдонуу

Дарыны кош бойлуулук же эмизүү мезгилинде пайда/тобокел катышын баалап жана дарынын дозалоо режимин так аткарып, дарыгер көзөмөлү астында колдонуу мүмкүн.

Педиатрияда колдонуу

Дарыны 3 жашка чейин балдар үчүн колдонууга болбойт. Эвкалипт жана ачуу жалбыздын эфир майларынын курамы менен шартталган рефлектордук бронхоспазмдын өрчүү мүмкүнчүлүгүнө байланыштуу 3 жаштан баштап балдар үчүн этияттык менен колдонуу керек.

Авто унааны башкарууда же башка механизмдер менен иштөөде реакция ылдамдыгына таасир этүү жөндөмдүүлүгү

Дары транспорт каражаттарын жана механизмдерди башкаруу жөндөмдүүлүгүнө таасир этпейт, бирок авто унаа айдоочуларына алкоголго изилдөөлөр натыйжаларынын мүмкүн болгон бурмaloосун эске алуу керек.

Ашыкча доза

Дозасынан ашыгуу учурлары сүрөттөлгөн эмес.

Дарылоо: дарыны токтолтуу, ооз көндөйүн кайнатылган жылуу суу менен чайкоо.
Дарылоо белгилерин жараша багытталган.

Жарактуулук мөөнөтү

2 жыл.

Дарыны таңгакчада көрсөтүлгөн жарактуулук мөөнөтү аяктагандан кийин колдонууга болбойт.

Сактоо шарттары

25 °C дан жогору болбогон аба табында сактоо керек.

Балдар жетпеген жерде сактоо керек.

Таңгакча

Алюминий баллондо 30 г дан. Ар бир сепкич, коргоочу капқакча менен баллон жана медициналык колдонуу боюнча нускама менен кутуга салынат.

Берүү шарттары

Рецепти жок.

Өндүрүүчү

«Микрофарм» ЖЧКсы.

Украина, 61013, Харьков ш., Шевченко көчөсү, 20.

Өндүрүүчүнүн жайгашкан жери жана ишмердүүлүгүнүн дареги

«Микрофарм» ЖЧКсы.

Украина, 61013, Харьков ш., Шевченко көчөсү, 20.