

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування лікарського засобу**  
**БОМ-БЕНГЕ МАЗЬ**

**Склад:**

*діючі речовини:* 1 г мазі містить: ментолу 39 мг, метилсаліцилату 202 мг;  
*допоміжні речовини:* парафін, парафін білий м'який.

**Лікарська форма.** Мазь.

*Основні фізико-хімічні властивості:* мазь білого або жовтого кольору з сильним специфічним запахом. За зовнішнім виглядом мазь повинна бути однорідною.

**Фармакотерапевтична група.**

Засоби для місцевого застосування при болях у суглобах і м'язах.  
Код АТХ M02A C.

**Фармакологічні властивості.**

*Фармакодинаміка.* Комбінований препарат для зовнішнього застосування. Метилсаліцилат виявляє протизапальний, знеболювальний, подразнювальний та відволікаючий ефекти, в основі яких лежить вплив на підвищену проникність капілярів, процеси мікроциркуляції, гальмування активності медіаторів запалення, у тому числі брадикініну, що чинить альгогенну дію. Подразнення ментолом чутливих нервових закінчень спричиняє легкий місцевий знеболювальний ефект.

*Фармакокінетика.* Не вивчалась.

**Клінічні характеристики.**

**Показання.**

Ревматизм (суглобовий та м'язовий), ішіас, артрит, невралгія, ексудативний плеврит.

**Протипоказання.**

Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату, захворювання шкіри, ушкодження, рани шкіри у місці нанесення препарату.

Підвищена чутливість до ацетилсаліцилової кислоти, ібупрофену або інших нестероїдних протизапальних засобів, особливо при наявності бронхіальної астми в анамнезі.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Хоча достатньо контрольовані випробування взаємодії не проводилися, не виключено, що надмірне застосування саліцилатів для місцевого застосування може збільшити ефект кумаринових антикоагулянтів та антитромбоцитарних препаратів. У зв'язку з цим пацієнтам, які приймають кумаринові антикоагулянти та антитромбоцитарні препарати, включаючи аспірин, слід проявляти обережність.\*

**Особливості застосування.**

Запобігати потраплянню мазі в очі. У разі випадкового потрапляння мазі в очі необхідно промити їх водою і негайно звернутися до лікаря.

Не застосовувати особам, схильним до алергічних реакцій на компоненти препарату.

Препарат наносити на неушкоджені ділянки шкіри. При втиранні у шкіру виникає відчуття холоду, потім теплоти, слабого печіння та поколювання.



Не застосовувати з оклюзійною пов'язкою.

Після кожного застосування мазі ретельно мити руки. При сильному подразненні шкіри втирання слід припинити.

Препарат містить саліцилати, що є аспіриноподібними речовинами, тому слід брати до уваги застереження щодо застосування аспірину.

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

Безпека та ефективність застосування препарату під час вагітності або у період годування груддю не вивчалися.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.*

Не впливає.

**Спосіб застосування та дози.**

Препарат застосовують зовнішньо. Втирають 2–3 рази на добу в болючі ділянки тіла, у тому числі грудної клітки (при плевриті). Після втирання мазі рекомендується накладати суху зігріваючу пов'язку.

Тривалість застосування зумовлена характером і вираженістю захворювання, характером супутньої терапії, досягнутим ефектом.

*Діти.*

Не застосовувати дітям віком до 3 років через вміст у препараті ментолу.

**Передозування.**

Відчуття сильного тепла та печіння у місці нанесення мазі, посилення проявів побічних реакцій.

**Побічні реакції.**

Можливі опіки шкіри, пухирці та тимчасові реакції з боку шкіри. Відчуття холоду, потім теплоти, слабого печіння та поколювання, можливі алергічні реакції, включаючи почервоніння шкіри, висипання, кропив'янку, контактний дерматит, свербіж.

**Термін придатності.** 3 роки.

**Умови зберігання.**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.  
Зберігати у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

По 25 г в тубах у пачках або без пачок.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

**Виробник/заявник.**

ТОВ «Тернофарм».

**Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності/ місцезнаходження заявника.**

ТОВ «Тернофарм».

Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4.

Тел./факс: (0352) 521-444, www.ternopharm.com.ua

**Дата останнього перегляду.**

Узгоджено з матеріалами  
реєстраційного досьє

Узгоджено з матеріалами  
реєстраційного досьє

23.11.2017

