

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства
здравоохранения Украины
19.05.2012 № 543
Регистрационное удостоверение
№ UA/4306/01/01

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного средства

ИНГАЛИН®

Состав:

действующие вещества: 1 флакон содержит ментола 0,284 г, эвкалипта настойки 14,28 мл;
вспомогательные вещества: этанол 96 %, глицерин.

Лекарственная форма. Жидкость для ингаляции.

Основные физико-химические свойства: жидкость желто-бурого цвета, своеобразного запаха. Допускается выпадение осадка.

Фармакотерапевтическая группа. Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Отхаркивающие средства.
Код АТХ R05C A10.

Фармакологические свойства.

Фармакодинамика.

Проявляет антисептическую активность (обусловленную окислительными свойствами терпенового компонента эфирного масла эвкалипта настойки), оказывает противовоспалительное, отхаркивающее и незначительное обезболивающее действие (ментол).

Фармакокинетика.

Не изучалась.

Клинические характеристики.

Показания.

В составе комплексного лечения острых респираторных заболеваний верхних дыхательных путей, фарингитов, трахеитов, бронхитов, пневмоний.

Противопоказания.

Повышенная индивидуальная чувствительность к ингредиентам препарата. Бронхиальная астма и спазм легких.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.

На данное время взаимодействие Ингалина® с другими лекарственными препаратами не выявлено.

Особенности применения.

В процессе хранения Ингалина® допускается выпадение осадка. Перед применением препарата содержимое флакона необходимо взбалтывать. Ингалин® использовать с применением тепловлажного ингалятора. В связи с возможностью развития рефлекторного



бронхоспазма детям следует применять препарат под присмотром врача или взрослых. При возникновении одышки, лихорадки или гнойной мокроты, следует проконсультироваться с врачом.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Применение препарата в период беременности и кормления грудью возможно только после оценки врачом соотношения риск/польза.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.

В период лечения Ингалином® пациенту нужно воздержаться от управления транспортными средствами и выполнения другой работы, которая нуждается в повышенном внимании, скорости психических и двигательных реакций.

Способ применения и дозы.

Для ингаляций взрослым назначать по 10-20 капель Ингалина® на 1 стакан (200 мл) теплой воды, а детям с 3-х лет – по 5-10 капель. Ингаляции рекомендуется проводить 3-4 раза в сутки. Продолжительность курса лечения определяет врач в зависимости от состояния больного и клинического эффекта.

Дети.

Не применять детям до 3 лет.

Передозировка.

При продолжительном применении в значительных дозах возможны головокружение, спутанность сознания, мышечная слабость, тошнота, двоение в глазах. В таких случаях следует прекратить прием препарата. Терапия симптоматическая.

Побочные реакции.

Препарат обычно хорошо переносится, но могут возникнуть аллергические реакции, в частности, в виде высыпаний на коже, зуда, иногда контактного дерматита (в области губ), отека Квинке, крапивницы; бронхоспазм, ларингоспазм, апноэ. При выраженных реакциях применение препарата необходимо прекратить.

Срок годности. 3 года.

Условия хранения.

Хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Упаковка.

По 40 мл во флаконах стеклянных в пачке или без пачки.

По 40 мл во флаконе полимерном в пачке.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель/заявитель.

ООО «Тернофарм».

Местонахождение производителя и адрес места осуществления его деятельности.

ООО «Тернофарм».

Украина, 46010, г. Тернополь, ул. Фабричная, 4.

Тел./факс: (0352) 521-444, <http://www.ternopharm.com.ua>

Дата последнего пересмотра.

Александр

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного досьє

Летит узгоджено



Узгоджено з матеріалами
реєстраційного досьє

Летит