



**Инструкция по медицинскому применению
лекарственного средства
ИНГАЛИПТ-Н**

Название лекарственного средства.
Ингалипт-Н.

Общая характеристика:
Основные физико-химические свойства: прозрачная жидкость от светло-желтого до темно-желтого цвета со специфическим запахом;

Состав лекарственного средства.
Состав на один баллон:
Действующие вещества: стрептоцид растворимый - 0,750 г, норсульфазол натрия - 0,750 г; тимол – 0,015 г, масло мяты перечной– 0,015 г, масло эвкалиптовое– 0,015 г.
Вспомогательные вещества: глицерин, спирт этиловый 96%, полисорбат-80, сахар, вода очищенная.

Форма выпуска.
Спрей для местного применения.

Код классификации лекарственного средства.
Препараты, применяемые при заболеваниях горла. Антисептики. Код АТС R02A A20.

Фармакологические свойства.
Фармакодинамика. Ингалипт-Н проявляет антибактериальное и противовоспалительное действие, а также охлаждающее и отвлекающее действие. Комбинация указанных фармакологических свойств обеспечивает терапию воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей и слизистой оболочки полости рта. Ингалипт-Н не проявляет ulcerогенного и общетоксического действия на организм

Фармакокинетика. Ингалипт-Н предназначен для местного ингаляционного применения и образует терапевтическую концентрацию главным образом в очаге воспаления. В системе кровообращения частично всасываются сульфаниламиды (стрептоцид растворимый и норсульфазол натрия), которые обратимо связываются с белками крови: стрептоцид на 12-14%, норсульфазол натрия – на 55%. В процессе биотрансформации образуются ацетилированные формы сульфаниламидов, в виде которых они выводятся почками. Период полувыведения стрептоцида растворимого составляет 10 часов, норсульфазола натрия – 1,2 часа.

Показания для применения.
Ингалипт-Н предназначен для лечения острых воспалительных заболеваний носоглотки и гортани: тонзиллита, фарингита, ларингита, а также для лечения афтозного и язвенного стоматита.

Способ применения и дозировка.
Перед использованием Ингалипта-Н на аэрозольный баллон необходимо надеть

распылительную насадку, несколько раз встряхнуть баллон, после чего путем нажатия насадки до упора равномерно орошать препаратом пораженных участков.

Препарат применяют 3-4 раза в день. Курс лечения составляет 7-10 дней.

За один сеанс ингаляции осуществляют 2-3 распыления Ингалипта-Н и задерживают его в полости рта 5-7 минут.

Детям в возрасте старше 3 лет орошение производят 1-2 раза в сутки, если нет особых указаний врача.

Противопоказано детям до 3 лет. У детей возможно возникновение рефлекторного бронхоспазма в связи с наличием в составе препарата эвкалиптового масла и масла мяты перечной.

Побочное действие.

Препарат обычно хорошо переносится, но могут проявиться признаки аллергии в виде высыпания на коже, зуда, отека в местах контакта с препаратом. В случае появления аллергических реакций использование препарата прекратить.

Описаны реакции апноэ, бронхо-и ларингоспазма у пациентов с гиперчувствительностью к компонентам препарата. Сообщалось о проявлениях контактной чувствительности к маслу ментола у пациентов с симптомами, ассоциированными с синдромом «горящей» полости рта, рецидивирующими изъязвления слизистой оболочки или лихеноидной реакцией. Имеются сообщения об аллергических реакциях, таких как головная боль, брадикардия, мышечный тремор, атаксия, анафилактический шок и эритематозная кожная сыпь. Частота указанных побочных реакций не известна.

После применения лекарственных средств, содержащие масло эвкалипта, возможны аллергические реакции (крапивница, контактный дерматит и раздражение кожи). В случае передозировки при приеме внутрь у детей описаны дозозависимые симптомы угнетения центральной нервной системы (сонливость, угнетение сознания, потеря сознания). Имеются сообщения о следующих симптомах: изжога, тошнота, рвота, головокружение, мышечная слабость, миоз, удушье, цианоз, бред и судороги. Частота возникновения данных побочных реакций не известна.

Противопоказания.

Индивидуальная непереносимость сульфаниламидов, эфирных масел или других компонентов препарата, детский возраст.

Тяжелая почечная недостаточность, заболевания крови, тиреотоксикоз, беременность, лактация.

Применение Ингалипт-Н противопоказано у детей, имеющих приступы судорог в анамнезе.

Противопоказано детям до 3 лет. У детей возможно возникновение рефлекторного бронхоспазма в связи с наличием в составе препарата эвкалиптового масла и масла мяты перечной.

Передозировка.

Передозировка препарата может вызывать аллергические реакции.

Случайная передозировка масла мяты перечной может вызвать серьезные желудочно-кишечные симптомы, такие как диарея, ректальные язвы; эпилептические судороги, потеря сознания, апноэ, тошнота, нарушение сердечного ритма, атаксию. В случае передозировки необходимо промывание желудка. Лечение симптоматическое.

Меры предосторожности.

Перед первым применением сделать несколько нажатий на распылитель до появления дисперсной струи.

Перед применением Ингалипта-Н ротовую полость необходимо прополоскать теплой кипяченой водой. При ожогах с пораженных участков стерильным тампоном снять некротический налет.

После использования препарата снять горловой распылитель со штока и промыть его теплой водой.

У пациентов, страдающих изжогой или имеющих грыжу пищеводного отверстия диафрагмы, иногда наблюдается обострение симптомов после приема масла мяты перечной. В этом случае лечение должно быть прекращено. Препараты, содержащие масло мяты перечной следует использовать с осторожностью при воспалительных и язвенных поражениях желудочно-кишечного тракта.

Следует избегать случайного попадания масла эвкалиптового на лицо, и, особенно нос, младенцев или маленьких детей.

Препараты, содержащие масло эвкалипта, не следует назначать внутрь детям или пациентам с воспалительными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, желчного пузыря или нарушениями функции печени.

Применение в период беременности или кормления грудью. Противопоказаний для применения препарата в период беременности и кормления грудью нет, но необходимо строго придерживаться режима дозирования препарата.

Дети. Лечение детей следует проводить под наблюдением врача.

Применять детям старше 3 лет, учитывая возможность развития рефлекторного бронхоспазма.

Влияние на способность управлять автомобилем и работать с механизмами.

Применение препарата не влияет на способность управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами, но водителям следует учитывать возможное искажение результатов теста на алкоголь.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами.

При применении Ингалипта-Н с препаратами, производными п-аминобензойной кислоты (новокаин, анестезин, дикаин), происходит инактивация антибактериальной активности сульфаниламидов.

Условия и сроки хранения.

Хранить при температуре от 3 °С до 35 °С, в недоступном для детей месте, вдали от огня.

Срок годности - 2 года. Запрещается пользоваться препаратом после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска. Без рецепта.

Упаковка. По 30 г в баллоне аэрозольном алюминиевом с механическим насосом. Каждый баллон снабжен предохранительным колпачком и распылительной насадкой.

Информация о производителе.

ООО «Микрофарм», 61013, Украина, г. Харьков, ул. Шевченко, 20.