

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України

21.06.13 № 533

Реєстраційне посвідчення

№ UA/8418/01/01

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
КАЛЕНДУЛИ МАЗЬ

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: 1 г мазі містить календули настойки (*tinctura Calendulae*) (1:10) – 100 мг;
допоміжні речовини: парафін білий м'який, вода очищена, емульгатор Т-2.

Лікарська форма. Мазь.

Мазь жовтуватого кольору. За зовнішнім виглядом мазь повинна бути однорідною.

Назва і місцезнаходження виробника.

ТОВ «Тернофарм»
Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4.
Тел./факс: (0352) 521-444, <http://www.ternopharm.com.ua>.

Фармакотерапевтична група. Препарати, що сприяють загоюванню ран.
Код АТС D03A X.

Препарат чинить протизапальну, репаративну та антисептичну дію. Ці ефекти зумовлені багатим вмістом речовин (каротиноїди, флавоноїди, сапоніни, дубильні речовини, тритерпенові глікозиди, органічні кислоти, аскорбінова кислота).

Показання для застосування.

Опіки, порізи, тріщини, рани.

Протипоказання.

Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Запобігати потраплянню мазі в очі. У разі випадкового потрапляння мазі в очі необхідно промити їх водою і негайно звернутися до лікаря.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Не рекомендується застосовувати Календули мазь у період вагітності або годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не впливає.

Діти.

Безпека та ефективність застосування мазі дітям віком до 12 років не встановлені, тому призначати препарат цій категорії пацієнтів можна тільки після ретельної оцінки співвідношення ризик/користь (за призначенням лікаря).

Спосіб застосування та дози.

Мазь наносити тонким шаром на уражені ділянки (можна застосовувати під оклюзійну пов'язку). Тривалість застосування залежить від характеру та перебігу і тяжкості патологічного процесу та досягнутого ефекту.

Передозування.

Не виявлено. Можливе посилення проявів побічних реакцій.

Побічні ефекти.

При індивідуальній підвищеній чутливості можуть спостерігатися алергічні реакції, включаючи почервоніння шкіри, висипання, свербіж, ангіоневротичний набряк.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не встановлена.

Термін придатності.

1 рік.

Умови зберігання.

Зберігати у захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 20 г у банках або тубах у пачці або без пачки.

Категорія відпуску.

Без рецепта.

Дата останнього перегляду.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного дос'є та достовірно
відомими даними щодо застосування
лікарського засобу