

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
08.04.13 № 236
Реєстраційне посвідчення
№ МД/8483/01/01

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

М'ЯТИ ПЕРЦЕВОЇ НАСТОЙКА

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: 1 флакон містить настоїки м'яти перцевої (*Menthae piperitae folium*) (1:20)

(екстрагент – етанол 90 %) – 25 мл;

допоміжна речовина: олія м'яти перцевої.

Лікарська форма.

Настойка.

Рідина від зеленого до зелено-бурого кольору, з запахом м'яти перцевої. У процесі зберігання можливе випадання осаду.

Назва і місцезнаходження виробника.

ТОВ «Тернофарм»

Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4

Тел./факс: (0352) 521-444, <http://www.ternopharm.com.ua>.

Фармакотерапевтична група. Протиблювальні засоби та препарати, що усувають нудоту. Код АТС A04A D.

Олія м'яти перцевої (містить до 70 % ментолу та його ефірів) та інші біологічно активні речовини, що містяться у листі м'яти перцевої (кетон-ментон, олеанолова та урсолова кислоти, флавоноїдні глікозиди), стимулюючи чутливі рецептори слизових оболонок ротової порожнини та шлунка, рефлекторним шляхом зменшують відчуття нудоти і запобігають блюванню, а також чинять помірну спазмолітичну, заспокійливу та жовчогінну дію.

Показання для застосування.

Нудота, блювання, розлади травлення, стенокардія, невралгічні болі.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Бронхіальна астма і спазмофілія.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Пацієнтам зі шлунково-стравохідним рефлюксом (печією) слід уникати застосування препарату, оскільки може збільшитися печія.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

М'яти перцевої настойка містить спирт етиловий, тому препарат не рекомендується застосовувати у період вагітності або годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Слід мати на увазі, що до складу препарату входить спирт етиловий, тому слід утримуватися від керування автотранспортом або роботи з потенційно небезпечними механізмами.

Діти.

Не рекомендується застосовувати М'яти перцевої настойку дітям до 12 років через вміст спирту етилового, що входить до складу препарату.

Спосіб застосування та дози.

Препарат приймати внутрішньо до їди. Дорослим і дітям віком від 12 років призначати по 10-15 крапель настоїки 3-4 рази на день.

Тривалість лікування залежить від перебігу захворювання та індивідуальної чутливості до препарату.

Передозування.

Нераціональне застосування препаратів м'яти може привести до болю у ділянці серця. Терапія симптоматична.

Побічні ефекти.

Можливі алергічні реакції (у т. ч. гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри, крапив'янка, контактний дерматит). Прияві побічних реакцій слід припинити прийом препарату та звернутися до лікаря.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не виявлена.

Термін придатності.

3 роки.

Умови зберігання.

Зберігати у захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °C.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 25 мл у флаконах-крапельницях, флаконах.

Категорія відпуску:

Без рецепта.

Дата останнього перегляду.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного досьє та достовірно
відомими даними щодо застосування
лікарського засобу