

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
30.08.2019 № 1925
Реєстраційне посвідчення
№ UA/14265/01/01

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу

ОКСОЛІНОВА МАЗЬ

Склад:

діюча речовина: оксолін;

1 г мазі містить оксоліну 2,5 мг;

допоміжні речовини: олія мінеральна, парафін білий м'який.

Лікарська форма. Мазь.

Основні фізико-хімічні властивості: мазь від білого до жовтого кольору. Можлива поява рожевого відтінку при зберіганні.

Фармакотерапевтична група.

Засоби, що застосовують при кашлі та застудних захворюваннях. Інші протизастудні лікарські засоби. Код АТХ R05 X.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Лікарський засіб при місцевому застосуванні проявляє вірицидну дію на віруси грипу і аденовіруси.

Фармакокінетика.

Блокує місця зв'язування вірусу грипу (переважно типу А2) з поверхнею клітинної мембрани, захищає клітини від проникнення в них вірусу.

Клінічні характеристики.

Показання.

Індивідуальна профілактика грипу в період епідемії; лікування вірусних ринітів.

Протипоказання.

Індивідуальна підвищена чутливість до оксоліну та інших компонентів препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Рекомендується з обережністю застосовувати препарат одночасно з адреноміметичними засобами для інтраназального застосування через можливе пересушування слизової оболонки порожнини носа.

Особливості застосування.

Мазь не призначена для нанесення на слизову оболонку очей.

Лікарський засіб не можна наносити на уражену шкіру.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

У період вагітності або годування груддю застосовують препарат з обережністю, у разі, коли користь від застосування перевищує потенційний ризик для плода.

Узгоджено з матеріалами реєстраційного дос'є

Узгоджено з матеріалами реєстраційного дос'є



Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Дані щодо впливу «Оксолінової мазі» на здатність керувати автотранспортом або працювати з іншими механізмами відсутні.

Спосіб застосування та дози.

Для лікування вірусних ринітів та профілактики грипу лікарський засіб застосовують інтраназально. Для лікування вірусного риніту змазують слизову оболонку носа 2–3 рази на добу впродовж 3–4 днів. Для індивідуальної профілактики грипу в період епідемії рекомендується щоденне змазування слизової оболонки носа вранці та ввечері, а також протягом доби безпосередньо перед можливим контактом з хворими на грип.

Діти.

Дослідження з безпеки та ефективності застосування оксоліну дітям не проводились.

Передозування.

Випадки передозування невідомі.

Симптоми: можливі відчуття печіння на слизовій оболонці носа та ринорея.

Лікування: припинити застосування мазі, залишки засобу змити теплою водою.

Побічні реакції.

У місці нанесення мазі може виникати відчуття печіння, яке швидко минає; посилення виділень з носа; забарвлення слизової оболонки у синій колір. Можливий розвиток реакції гіперчутливості.

Термін придатності.

2 роки.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі від 2 °С до 8 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 10 г у тубі № 1.

Категорія відпуску.

Без рецепта.

Виробник/заявник.

ТОВ «Тернофарм».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності/ місцезнаходження заявника.

Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4.

Тел./факс: (0352) 521-444, www.ternopharm.com.ua

Дата останнього перегляду.

Узгоджено з матеріалами реєстраційного досьє

Текст

узгоджено

07.06.2019 р.



Узгоджено з матеріалами реєстраційного досьє