

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства
здравоохранения Украины
30.08.2019 № 1925
Регистрационное удостоверение
№ UA/14265/01/01

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного средства
ОКСОЛИНОВАЯ МАЗЬ

Состав:

действующее вещество: оксолин;
1 г мази содержит оксолина 2,5 мг;

вспомогательные вещества: масло минеральное, парафин белый мягкий.

Лекарственная форма. Мазь.

Основные физико-химические свойства: мазь от белого до желтого цвета. Возможно появление розового оттенка при хранении.

Фармакотерапевтическая группа.

Противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний. Другие противокашлевые препараты. Код ATX R05 X.

Фармакологические свойства.

Фармакодинамика.

Лекарственное средство при местном применении обладает вирицидным действием на вирусы гриппа и адено-вирусы.

Фармакокинетика.

Блокирует места связывания вируса гриппа (преимущественно типа A2) с поверхностью клеточной мембранны, защищает клетки от проникновения в них вируса.

Клинические характеристики.

Показания.

Индивидуальная профилактика гриппа в период эпидемии; лечение вирусных ринитов.

Противопоказания.

Индивидуальная повышенная чувствительность к оксолину и другим компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.

Рекомендуется с осторожностью применять препарат одновременно с адреномиметическими средствами для интраназального применения из-за возможного пересушивания слизистой оболочки полости носа.

Особенности применения.

Мазь не предназначена для нанесения на слизистую оболочку глаз.

Лекарственное средство нельзя наносить на поврежденную кожу.

Применение в период беременности или кормления грудью.

В период беременности или кормления грудью препарат применяют с осторожностью в том случае, когда польза от применения превышает потенциальный риск для плода.

Узгоджено з матеріалами реєстраційного досьє



Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.

Данные относительно влияния «Оксолиновой мази» на способность управлять автотранспортом или работать с другими механизмами отсутствуют.

Способ применения и дозы.

Для лечения вирусных ринитов и профилактики гриппа лекарственное средство применяют интраназально. Для лечения вирусного ринита смазывают слизистую оболочку носа 2–3 раза в сутки в течение 3–4 дней. Для индивидуальной профилактики гриппа во время эпидемии рекомендуется ежедневное смазывание слизистой оболочки носа утром и вечером, а также в течение суток непосредственно перед возможным контактом с больными гриппом.

Дети.

Исследования по безопасности и эффективности применения оксолина детям не проводились.

Передозировка.

Случаи передозировки не известны.

Симптомы: возможны ощущения жжения на слизистой оболочке носа и ринорея.

Лечение: прекратить применение мази, остатки средства смыть теплой водой.

Побочные реакции.

В месте нанесения мази может наблюдаться жжение, которое быстро проходит; обильные выделения из носа; окрашивание слизистой оболочки в синий цвет. Возможно развитие гиперчувствительности.

Срок годности.

2 года.

Условия хранения.

Хранить в оригинальной упаковке при температуре от 2 °C до 8 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка.

По 10 г в тубе № 1.

Категория отпуска.

Без рецепта.

Производитель/заявитель.

ООО «Тернофарм».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности/местонахождение заявителя.

Украина, 46010, г. Тернополь, ул. Фабричная, 4.

Тел./факс: (0352) 521-444, www.ternopharm.com.ua

Дата последнего пересмотра.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного досьє

07.06.2019

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного досьє

