



Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat (xəstələr üçün)

**PROPOSOL-MKF** ağız boşluğu üçün sprey  
**PROPOSOL-MKF**

**Tərkibi**

*Təsireddi maddə:* 1 konteynerdə 1,2 q və ya 3,6 q propolis vardır.  
*Köməkçi maddələr:* 96%-li etanol, qliserin.

**Təsviri**

Qəhvəyi və ya sarı-qəhvəyi rəngdən qırmızı-qəhvəyi rəngə qədər, xarakterik qoxulu mayedir.

**Farmakoterapeutik qrupu**

Stomatologiyada istifadə edilən vasitə.

**ATC kodu:** A01AB11.

**Farmakoloji xüsusiyyətləri**

Propolisin təsireddi maddəsinin tərkibində təbii birləşmələr (flavonoidlər, amin turşuları, qətran, üzvi turşular, efir yağları, vitaminlər, mikroelementlər) olan bioloji aktiv komplekslər vardır. Propolis təzahürlü antimikrob, iltabəleyhinə, reparativ və antioksidant təsirə malikdir ki, bunlar da, kataral, aftoz, xoralı stomatiitlərdə, kataral qinqivitdə, qlossitdə, parodontitdə müalicəvi təsiri təmin edir. Bundan başqa, spreyin tərkibinə qliserin və etil spiriti daxildir ki, bunlar da, yumşaldıcı və antiseptik terapeutik effekt göstərir. Qeyd edilən farmakoloji xüsusiyyətlərin kombinasiyası ağız boşluğunun selikli qişasının iltihabi xəstəliklərininin kompleks patogen terapiyasını təmin edir, yerli qıcıqlandırıcı və ümumi toksik təsir göstərmir.

Proposol-MKF 2-4 dəqiqə ərzində ağız boşluğunun selikli qişasına sorulur və yerli rezorbtiv müalicəvi təsir göstərir.

**İstifadəsinə göstərişlər**

Ağız boşluğunun selikli qişasının iltihabi xəstəliklərinin yerli müalicəsində: aftoz, kataral, xora simptomları; tonzillit, kataral qinqivit, qlossit.

**Əks göstərişlər**

Preparatın istenilən komponentinə və arıcılıq məhsullarına qarşı yüksək həssaslıq, ekzema (kəskin formaları), selikli qişanın zədələnmiş nahiyyəsindən qanaxma.

**Xüsusi göstərişlər və ehtiyat tədbirləri**

Preparatı istifadə etməzdən əvvəl ağız boşluğunu qaynanmış su ilə yumaq məsləhət görülür.

Preparatın gözə düşməsindən çəkinmək lazımdır.

### **Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri**

Digər antiseptik vasitələrlə və ya arıcılıq məhsulları ilə eyni vaxtda istifadə etmək məsləhət görülmür.

### **Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi**

Hamiləlik zamanı preparatı, yalnız o zaman istifadə etmək olar ki, ana üçün gözlənilən fayda dölə olan potensial riskdən üstün olsun. Laktasiya dövründə preparatın istifadəsinə ehtiyac olduqda, ana südü ilə qidalandırmanın dayandırmaq lazımdır.

### **Pediatriyada istifadəsi**

Preparati 12 yaşa qədər uşaqlarda istifadə etmək olmaz.

### **Nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsiri**

Preparatin tərkibində 80% və ya 96% etanol vardır. Püskürdüğünün başlığından 1-2 saniyə ərzində basan zaman ağız boşluğununa preparatla birlikdə 0,8 q 96%-li etanol daxil olur ki, bu da, nəqliyyat vasitəsini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarə edərkən, reaksiyaların sürətinə mənfi təsir etmir.

### **İstifadə qaydası və dozası**

Preparat böyüklərdə və 12 yaşdan yuxarı uşaqlarda ağız boşluğunun zədələnmiş nahiyyəsinin isladılması üçün istifadə edilir. Müalicənin əvvəlində preparat sutkada 2-3 dəfə, sonra iltihabi prosesin təzahürü azaldıqda, sutkada 1-2 dəfə tam sağalana qədər istifadə edilir. Müalicə kursu 3-7 gündür.

#### *Preparatdan istifadə qaydası*

1. Flakonun qoruyucu qapağını açmaq və püskürdüğünün təmiz olmasına əmin olmaq və onu klapanın ştokuna taxmaq lazımdır.
2. Püskürdüğünün istiqaməti yuxariya doğru olmaqla, flakonu şaquli vəziyyətdə tutub, mayenin ilk damcıları yaranana qədər püskürdüğünün başlığından bir neçə dəfə basmaq lazımdır.
3. Püskürdüğünün sərbəst ucunu ağız boşluğununa yeridib və onu zədələnmiş nahiyyəyə istiqamətləndirmək lazımdır, püskürdüğünün başlığına 1-2 dəfə basmaq və bərabər şəkildə ağız boşluğu sahəsini preparatla islatmaq lazımdır.
4. Preparati püskürtdükdən sonra ağız boşluğunun yanma hissəyyatı aradan qalxana qədər qida və içki qəbulundan çəkinmək lazımdır.
5. İslatmanı bitirdikdən sonra flakonu qoruyucu qapaqla bağlamaq lazımdır.

#### *Püskürdüğünün təmizlənməsi*

Püskürdüğünün tixanmasının qarşısını almaq məqsədilə onu axar isti su ilə yumaq və suyun qalıqlarını çırpıb, yüksək temperaturun təsirinə məruz qalmamaqla isti yerdə qurutmaq lazımdır.

### **Əlavə təsirləri**

Allergik reaksiyalar (o cümlədən, allergik dermatit, hiperemiya, dəri qışınması, səpgi, laringospazm, təngnəfəslik, Kvinke ödemi), ürəkbulanma, yerli effektlər (dildə yüngül yanma hissi, ağızda quruluq).

### **Doza həddinin aşılması**

Allergik reaksiyalar, dözülməz yanma hissi və ağızda quruluq.

Qeyd edilən simptomların təzahürlü formalarında ağız boşüğunu isti qaynanmış su ilə yumaq, allergik reaksiyalar zamanı isə antihistamin preparatlar təyin etmək lazımdır.

**Buraxılış forması**

20 q və ya 60 q məhlul, mexaniki nasoslu konteynerdə. Hər konteyner qoruyucu qapaqla və püskürdücü ucluqla təchiz edilmişdir. 1 konteyner, içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya qablaşdırılır.

**Saxlanma şəraiti**

25°C temperaturdan yüksək olmayan və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır. Birbaşa düşən günəş şüalarından qorumaq lazımdır. Odun yaxınlığında püskürtmək olmaz.

**Yararlılıq müddəti**

2 il.

Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.

**Aptekdən buraxılma şərti**

Reseptsiz buraxılır.

**İstehsalçı**

“Mikrofarm” MMC.

**Ünvan**

Ukrayna, 61013, Xarkov ş., Şevçenko k., 20.