

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

ПРОПОСОЛ-Н

Регистрационный номер:

Торговое название: Пропосол-Н

Лекарственная форма: спрей для местного применения

Состав:

на один баллон 20 г или 60 г:

Действующее вещество: прополиса 1,20 г или 3,60 г,

Вспомогательные вещества: спирта этилового 96 % (этанол) 13,80 г или 41,40 г,
глицерина дистиллированного (глицерола) 5,00 г или 15,00 г.

Описание: коричневая или от желто-коричневого до красно-коричневого цвета жидкость с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа: стимулятор репарации тканей природного происхождения.

Код АТХ: D06BX

Фармакологическое действие

Действующее вещество прополис содержит комплекс биологически-активных природных соединений (флавоноиды, аминокислоты, смолы, органические кислоты, эфирные масла, витамины, микроэлементы) и обладает выраженными антимикробными, противовоспалительными, репаративными и антиоксидантными свойствами. Пропосол-Н в течение 2-4 минут всасывается слизистой оболочкой ротовой полости и проявляет местное лечебное действие.

Показания к применению

Пропосол-Н применяют местно при лечении воспалительных заболеваний слизистой оболочки ротовой полости: катаральный гингивит и стоматит, афтозный и язвенный стоматит, пародонтит.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к продуктам пчеловодства, возраст до 18 лет.

С осторожностью заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга, беременность, период грудного вскармливания.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата возможно с учетом пользы для матери и потенциального риска для плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Местно.

Перед применением на аэрозольный баллон необходимо надеть распылительную насадку, после чего нажатием насадки до упора равномерно оросить препаратом пораженный участок слизистой оболочки полости рта. Длительность распыления до 2 секунд. После орошения желательно не употреблять пищу в течение 15-30 минут.

Препарат применяют 2-6 раз в день, а после уменьшения воспалительного процесса – 1-2 раза в день до полного выздоровления. Курс лечения составляет 7-10 дней.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции: покраснение, зуд кожи, ангионевротический отек. Кратковременное жжение в месте нанесения препарата.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки при местном применении не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Неизвестно.

Особые указания

Во избежание закупорки отверстия распылителя по окончании манипуляции его необходимо продуть или поместить в стакан с чистой водой. При использовании флакон следует держать строго вертикально!

Избегать попадания препарата в глаза. В случае попадания в глаза промыть большим количеством воды.

Концентрация этанола в препарате 70%. Максимальная разовая доза препарата (0,7 мл) содержит 0,4 г абсолютного этилового спирта, максимальная суточная доза (до 4 мл) - 2,4 г.

В период применения препарата следует воздержаться от выполнения потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска

Спрей для местного применения, 20 г или 60 г.

По 20 г или 60 г в баллоны аэрозольные моноблочные алюминиевые с внутренним фенольно-эпоксидным защитным покрытием с механическими насосами дозирующего действия, снабженными насадками горловыми и предохранительными колпачками.

Каждый баллон с насадкой горловой, предохранительным колпачком и инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше + 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей.

Срок годности

2 года. Не использовать после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель:

ООО «Микрофарм»

Юридический адрес: Украина, 61013, г. Харьков, ул. Шевченко, 20

Фактический адрес: Украина, 61013, г. Харьков, ул. Шевченко, 20

Тел./факс (+38 057) 714-03-71, 714-20-80

Организация, принимающая претензий потребителей:

ООО «Микрофарм»

Адрес Украина, 61013, г. Харьков, ул. Шевченко, 20

Тел./факс (+38 057) 714-03-71, 714-20-80

Директор

ООО «Микрофарм»



Поляновский А.