

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА ПРОПОСОЛ-Н

*Информация предназначена для специалистов*

### **Название лекарственного средства.**

Пропосол-Н

### **Общая характеристика.**

Пропосол-Н представляет собой прозрачную жидкость темно-коричневого цвета, сладкую на вкус, с запахом прополиса.

### **Состав лекарственного средства.**

#### **Один контейнер содержит:**

*Действующего вещества:* прополиса 1,2 г или 3,6 г;

*Вспомогательных веществ:* глицерина, этанола 96%;

### **Форма выпуска.**

Спрей для ротовой полости.

### **Код классификации лекарственного средства.**

Противомикробные и антисептические средства для наружного применения при заболеваниях полости рта.

Код АТС А01А В11.

### **Фармакологические свойства.**

Действующим веществом препарата является продукт жизнедеятельности пчел – прополис, который содержит комплекс биологически активных природных соединений (флавоноиды, аминокислоты, смолы, органические кислоты, эфирные масла, витамины, микроэлементы). Прополис обладает антимикробными, противовоспалительными, антиоксидантными свойствами, стимулирует процессы регенерации.

### **Показания к применению.**

Местное лечение воспалительных заболеваний слизистой оболочки ротовой полости: афтозных, катаральных, язвенных стоматитов, катаральных гингивитов, глосситов.

Данные показания основаны на длительном опыте использования и не подтверждены в контролируемых клинических исследованиях.

### **Способ применения и дозировка.**

Препарат применяют взрослым и детям старше 12 лет для орошения пораженного участка в полости рта. В начале лечения препарат применяют 2-3 раза в сутки, после уменьшения выраженности воспалительного процесса – 1-2 раза в сутки до полного выздоровления. Курс лечения – 3-7 дней.

#### *Порядок пользования баллоном.*

1. Снять защитный колпачок с баллона, и убедившись в чистоте распылителя, надеть его на шток клапана.
2. Держа баллон вертикально, распылителем вверх, нажать несколько раз на голову распылителя до появления первых капель жидкости.
3. Свободный конец распылителя ввести в полость рта и, направив распылитель на пораженный участок, нажать на головку распылителя 1-2 раза и равномерно оросить препаратом участок полости рта.
4. После распыления препарата следует воздержаться от приема пищи и питья до прекращения жжения в полости рта.
5. Закончив орошение, необходимо закрыть баллон защитным колпачком.

*Уход за распылителем.* Во избежание закупорки распылителя, его промывают под струей теплой воды и, встряхнув остатки воды, просушивают в теплом месте, не подвергая воздействию высокой температуры.

### **Побочное действие.**

В отдельных случаях возможны жжение и сухость во рту, тошнота, аллергические реакции (такие как аллергический дерматит, гиперемия, зуд кожи, сыпь, ларингоспазм, отек Квинке).

### **Противопоказания:**

- детский возраст до 12 лет;

- лица с повышенной чувствительностью к продуктам пчеловодства;

Не рекомендуется наносить на раневую поверхность, использовать при экземе (в период обострения), кровоточивости слизистых оболочек.

### **Передозировка.**

Передозировка препарата может послужить причиной аллергических реакций: покраснение и отек слизистой оболочки ротовой полости, зуд кожи. Терапия симптоматическая.

В случае возникновения указанных симптомов, следует промыть ротовую полость теплой кипяченой водой и обратиться к врачу.

### **Меры предосторожности.**


Избегать попадания препарата в глаза. В случае попадания в глаза промыть большим количеством воды.

После орошения ротовой полости Пропосолом-Н желательно не употреблять пищу в течение 15-30 минут.

Препарат содержит этанол. При нажатии на головку распылителя - 1-2 раза в ротовую полость вместе с препаратом попадает от 0,08 г до 0,16 г этанола 96 %, это необходимо принимать во внимание пациентам, страдающим хроническим алкоголизмом, эпилепсией, заболеваниями печени. При возникновении аллергических реакций, применение препарата необходимо прекратить, принять антигистаминные препараты и обратиться к врачу.

**Применение в период беременности и кормления грудью.** Информация об опыте применения препарата в период беременности и кормления грудью отсутствует. Поскольку препарат содержит этиловый спирт, использовать лекарственное средство у данной категории пациентов не рекомендуется.

**Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.** Следует воздержаться от управления транспортными средствами или работы с потенциально опасными механизмами (из-за наличия в составе препарата спирта этилового).



*Дети.* Препарат не применяют детям в возрасте до 12 лет. Детям старше 12 лет применяют с осторожностью.

*Применение у лиц с нарушенной функцией печени и почек.* Препарат содержит этиловый спирт, с осторожностью использовать при патологии печени.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.**

Не рекомендуется применять одновременно с другими антисептическими средствами или продуктами пчеловодства.

**Условия и срок хранения.**

Хранить при температуре не выше + 25 °С в недоступном для детей месте.

Срок хранения - 2 года. Не применять по истечении срока годности.

**Условия отпуска.**

Без рецепта.

**Упаковка.**

По 20 г или по 60 г в контейнере аэрозольном алюминиевом с механическим насосом. По 1 контейнеру с распылительной насадкой, предохранительным колпачком и листком-вкладышем помещают в пачку.

**Информация о производителе.**

ООО «Микрофарм», 61013, Украина, г. Харьков, ул. Шевченко, 20,  
телефон: (057) 71-40-371.