



## МЯТЫ ПЕРЕЧНОЙ НАСТОЙКА

настойка

### ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

*Прочтите внимательно этот листок-вкладыш перед тем, как начать применение препарата!*

*Храните этот листок-вкладыш. Вам может понадобиться перечитать его снова.*

*Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим врачом.*

#### **Состав лекарственного средства.**

**основные физико-химические свойства:** жидкость от зеленого до зеленовато-коричневого цвета, с запахом мяты перечной. В процессе хранения возможно выпадение осадка;

**международное непатентованное название:** отсутствует;

**действующие вещества:** 1 флакон содержит настойки мяты перечной (1:20) – 25 мл, масла мяты перечной – 1,38 мл;

**вспомогательное вещество:** спирт этиловый 90 %.

**Лекарственная форма.** Настойка.

#### **Фармакотерапевтическая группа.**

Прочие средства для устранения тошноты. Код АТС А04А D.

**Фармакологические свойства.** Масло мяты перечной и другие биологически активные вещества, содержащиеся в листьях мяты перечной, оказывают дозозависимое спазмолитическое действие (связанное с влиянием ментола на перемещение кальция через клеточные мембраны), снижают тонус пищеводного сфинктера, уменьшают ощущение тошноты, вызывают желчегонный эффект.

#### **Показания к применению.**

**Внутрь:** симптоматическое лечение функциональных расстройств пищеварительного тракта (диспепсия, тошнота, метеоризм).

#### **Противопоказания.**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, а также к ментолу.

Бронхиальная астма и спазмофилия.

Эпилепсия и судорожный синдром в анамнезе (включая фебрильные судороги).

Заболевания печени, холангит, ахлоргидрия, желчнокаменная болезнь и другие заболевания желчевыводящих путей.

Воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта.

Детский возраст до 12 лет. Беременность, период лактации.

**С осторожностью:** алкоголизм, черепно-мозговая травма и другие заболевания головного мозга со снижением судорожного порога.

#### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами.**

Необходимо избегать одновременного применения других лекарственных средств, содержащих этиловый спирт.

Взаимодействия, связанные с наличием в составе этилового спирта:

- лекарственные средства, вызывающие дисульфирамоподобную реакцию (ощущение жара, покраснение кожных покровов, рвота, тахикардия) при совместном приеме с алкоголем: дисульфирам, цефамандол, цефоперазон, латамоксеф, хлорамфеникол, хлорпропамид,

СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВОм ЗАВАОХРАНИМЕС  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Управления  
Республики Беларусь

глибенкламид, глипизид, толбутамид и другие гипогликемические препараты, гризеофульвин, метронидазол, орнидазол, тинидазол, кетоконазол, прокарбазин; - лекарственные средства, угнетающие функции центральной нервной системы.

#### **Меры предосторожности.**

Пациентам с желудочно-пищеводным рефлюксом (изжогой), грыжей пищеводного отверстия диафрагмы следует избегать применения лекарственного средства, поскольку может усиливаться изжога.

Если во время приема лекарственного средства возникает или усиливается изжога, прием лекарственного средства необходимо прекратить.

Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

Лекарственное средство содержит не менее 81 % этанола, то есть не менее 221-330 мг на разовую дозу (10-15 капель).

#### ***Применение в период беременности или кормления грудью.***

Безопасность применения во время беременности и лактации не установлена. В связи с отсутствием достаточных данных и содержанием этилового спирта применять во время беременности и лактации не рекомендуется.

#### ***Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.***

Следует иметь в виду, что в состав препарата входит спирт этиловый, поэтому следует воздержаться от управления автотранспортом или работы с потенциально опасными механизмами.

#### ***Дети.***

Не рекомендуется применять Мяты перечной настойку детям до 12 лет, поскольку в состав препарата входит спирт этиловый.

#### **Способ применения и дозировка.**

Принимают внутрь до еды. Взрослым и детям старше 12 лет назначают по 10-15 капель настойки, разведенных в ¼ стакана воды, 3-4 раза в день.

Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, переносимости лекарственного средства и достигнутого эффекта.

Не рекомендуется применять настойку в течение длительного времени из-за содержания этанола. Продолжительность приема у детей должна быть минимальной. Во время лечения необходимо избегать приема других этанолсодержащих средств.

#### **Передозировка.**

В связи с содержанием масла мяты перечной при передозировке возможно развитие серьезных желудочно-кишечных расстройств, диареи, язв прямой кишки, эпилептических судорог, потери сознания, апноэ, нарушений сердечного ритма, атаксии и других расстройств со стороны центральной нервной системы.

В случае появления симптомов передозировки необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу. При острой передозировке необходимо провести индукцию рвоты, промывание желудка. Симптоматическая терапия.

#### **Побочные эффекты.**

Аллергические реакции на ментол могут сопровождаться развитием гиперемии, зуда, отека кожи, контактного дерматита, головной боли, брадикардии, мышечного тремора, атаксии, анафилактического шока и эритематозной кожной сыпи.

Возможно возникновение изжоги, тошноты, рвоты, чувства жжения в полости рта и вокруг рта, появление язв в полости рта, нарушения зрения.

Возможно развитие дизурии, моча может приобретать запах ментола.



В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

**Срок годности препарата.**

Срок годности составляет 3 года.

*Нельзя применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке!*

**Условия хранения.**

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. *Хранить в недоступном для детей месте!*

**Упаковка.**

По 25 мл во флаконе стеклянном, укупоренном пробкой и крышкой. Каждый флакон стеклянный, вместе с листком-вкладышем и пробкой-капельницей, помещают в пачку из картона. По 25 мл во флаконе полимерном, укупоренном пробкой-капельницей и крышкой с контролем первого вскрытия. Каждый флакон, вместе с листком-вкладышем, помещают в пачку из картона.

**Правила отпуска.**

Без рецепта.

**Название и адрес производителя.**

ООО «Тернофарм».  
Украина, 46010, г. Тернополь, ул. Фабричная, 4;  
тел./факс (0352) 521-444, <http://www.ternopharm.com.ua>