

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**по медицинскому применению препарата**  
**ВОДЯНОГО ПЕРЦА ЭКСТРАКТ**  
**(EXTRACTUM POLYGONI HYDROPIPERIS)**

**Общая характеристика:**

*международное название:* Polygonum hydropiper;

*основные физико-химические свойства:* прозрачная жидкость зеленовато-бурого цвета, горьковато-вяжущего вкуса, ароматного запаха;

*состав:* спиртовой экстракт из травы водяного перца 1:1.

**Форма выпуска.** Экстракт жидкий для перорального применения, спиртовой.

**Фармакотерапевтическая группа.** Гемостатическое, кровоостанавливающее средство растительного происхождения. Код АТС В02 В Х04\*\*.

**Фармакологические свойства.**

*Фармакодинамика.* Биофлавоноиды, содержащиеся в водяном перце (рутин, кверцетин, гиперозид, рамназин, кемпоферол, мирицетин, лютеолин), проявляют Р-витаминную активность, уменьшают проницаемость капилляров, нормализуют структуру сосудистой стенки, предохраняют от окисления аскорбиновую кислоту, содержащуюся в водяном перце. Совместно с аскорбиновой кислотой участвуют в окислительно-восстановительных реакциях, снижают активность гиалуронидазы.

Дубильные вещества проявляют противовоспалительное и вяжущее действие. Оказывают синергический эффект с биофлавоноидами по кровоостанавливающему действию.

*Фармакокинетика.* Максимальное фармакологическое действие биофлавоноидов перца водяного достигается за счет экстракции 70% этиловым спиртом. При данной концентрации в нем растворяются флавоноиды, находящиеся как в свободной (агликон), так и в связанной (с гликозидной частью) форме. Этим достигается максимальное всасывание основных действующих веществ через микроворсинки ЖКТ в кровь. После прохождения окислительно-восстановительных реакций с участием флавоноидов они подвергаются гидролизу на агликон и гликозид. Первый выделяется почками с мочой и через кишечник с желчью, последний (углеводный остаток) либо окисляется в цикле Кребса до окиси углерода и воды, либо депонируется в виде гликогена в организме.

**Показания к применению.** Препарат применяют как вспомогательное средство в акушерско-гинекологической практике при маточных послеродовых кровотечениях, при субинволюции матки, гиперменорагии. Кроме того, применяют при кровотечениях из мелких сосудов желудка, кишечника, при несильных геморроидальных кровотечениях.

**Способ применения и дозы.** Водяного перца экстракт взрослые принимают по 30 – 40 капель 3 – 4 раза в день (за полчаса до еды). Курс лечения зависит от характера и выраженности заболевания, достигнутого эффекта, характера комплексной терапии.

**Побочное действие.** Головная боль, тошнота, рвота, головокружение; в отдельных случаях возможны реакции повышенной чувствительности.

**Противопоказания.** Повышенная чувствительность к компонентам препарата, дети до 12 лет.

**Передозировка.** В случае передозировки лечение симптоматическое.

**Особенности применения.** Не применять вместе с молочной пищей для предотвращения образования невсасываемых (хелатных) комплексов с активными веществами.

В процессе хранения возможно выпадение осадка. Перед применением взболтать.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами.** На данное время взаимодействие с другими лекарственными препаратами не выявлено.

**Условия и срок хранения.** Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

*Хранить в недоступном для детей месте.*

Срок годности препарата составляет 3 года 6 месяцев.

**Условия отпуска.** Без рецепта.

**Упаковка.** По 25 мл во флаконе-капельнице, помещенной в пачку из картона.

**Производитель.** ОАО " Тернопольская фармацевтическая фабрика"

**Адрес.** 46010, Украина, г. Тернополь, ул. Фабричная, 4.  
тел./факс (0352) 521-444, [www.ternopharm.com.ua](http://www.ternopharm.com.ua)