

TƏSDİQ EDİLMIŞDİR
Azərbaycan Respublikası
Səhiyyə Nazirliyi
Farmakoloji və Farmakopeya
Ekspert Surasının sədri

E.M. Ağayev
“20” May 2020-ci il

Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat (xəstələr üçün)

TRİKARDİN ÜRƏK DAMCISI
TRICARDIN HEART DROPS

daxilə qəbul olunan damcı

Tərkibi

Təsirendici maddə: 1 ml preparatın tərkibində 0,34 ml pişikotu tinkturası (*tinctura Valerianae*) (1:5) (ekstragent – 70 %-li etanol), 0,33 ml yemişan tinkturası (*tinctura Crataegi*) (1:10) (ekstragent – 70 %-li etanol), 0,33 ml şirquyuğu tinkturası (*tinctura Leonuri*) (1:5) (ekstragent – 70 %-li etanol) vardır.

Təsviri

Sarımtıl-qəhvəyidən qəhvəyi-qonura qədər rəngli, pişikotu qoxulu mayedir. Saxlanma müddətində çöküntünün əmələ gəlməsi mümkün kündür.

Farmakoterapevtik qrupu

Müxtəlif kombinəolunmuş kardioloji preparatlar.

ATC kodu: C01E X.

Farmakoloji xüsusiyyətləri

Farmakodinamikası

Trikardin kardioloji və sedativ preparatdır. “Trikardin ürək damcısı” preparatının müalicəvi təsiri pişikotu kökünün və kökümsovunun, yemişan meyvələrinin, şirquyuğu otunun tərkibində olan bioloji aktiv maddələr kompleksinin təsiri ilə əlaqədardır.

Yemişan meyvələrinin tərkibində olan bioloji aktiv maddələr (flavonoidlər, xolin, asetilxolin, aşı maddələri, fitosterinlər) hipotenziv, kardioprotektor, spazmolitik xassələrə malikdir; tac damarlarda və beyin damarlarında qan dövranını gücləndirir, miokardin ürək qlikozidlərinin təsirinə qarşı həssaslığını yüksəldir, ürək əzələsinin yiğılma qabiliyyətini bir qədər gücləndirirlər və bununla yanaşı, onun oyanıqlığını aşağı salırlar.

Pişikotu kökünün və kökümsovunun tərkibində olan bioloji aktiv maddələr (borneolun və izovalerian turşusunun mürəkkəb efiri, borneol, izovalerian turşusu, alkaloidlər, aşı maddələr, saxaridlər) mərkəzi sinir sisteminin (MSS-in) oyanıqlığını aşağı salırlar, həddindən artıq psixi gərginlik və əqli yorğunluq zamanı gərginliyi və əsəbiliyi aşağı salırlar, sedativ, yuxugətirici, spazmolitik xüsusiyyətlər nümayiş etdirirlər, MMS-ə tormozlayıcı təsir göstərən digər dərman preparatlarının, xüsusiylə, sedativ və yuxugətirici preparatların, trankvilizatorların təsirini gücləndirirlər. Bundan əlavə, pişikotunun tərkibində olan bioloji aktiv maddələr ödqovucu təsir nümayiş etdirirlər, ürək ritmini ləngidirlər, ürəyin koronar damarlarını genişləndirirlər, mədənin selikli qışasının sekretor aktivliyini gücləndirirlər.

Şirquyuğu otunun tərkibində olan bioloji aktiv maddələr (efir yağı, saponinlər, aşı maddələr, alkaloidlər) mərkəzi sinir sistemində oyanma proseslərini aşağı salırlar, arterial təzyiqin normalaşmasına və fizioloji yuxunun baş verməsinə səbəb olurlar, və həmçinin, digər sedativ və

yuxugətirici preparatların effektlərini gücləndirirlər.

Farmakokinetikası

Öyrənilməyib.

İstifadəsinə göstərişlər

Ürək-damar sisteminin fəaliyyətinin funksional pozğunluqları (neyrosirkulyator distoniya, vegetonevroz), sinir gərginliyi baş verdikdə və yuxusuzluq zamanı sakitləşdirici preparat kimi.

Əks göstərişlər

Anamnezdə alkoqolizm; tərkibində alkoqol olan digər preparatların eyni zamanda istifadəsi; mədə və onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliyi; qaraciyər sirrozu; hamiləlik və ya laktasiya dövrü; depressiya və mərkəzi sinir sistemin tormozlanması ilə müşayiət olunan digər pozğunluqlar; şiddetli arterial hipotensiya və bradikardiya; preparatın tərkibində olan hər hansı komponentə qarşı yüksək həssaslıq.

Xüsusi göstərişlər və ehtiyat tədbirləri

“Trikardin ürək damcısı” preparatından istifadə müddətində alkoqol tərkibli içkilərin istifadəsində çəkinmək lazımdır. Qida komponentləri ilə qarşılıqlı təsirdən qaçınmaq məqsədi ilə, preparati yemək zamanı qəbul etmək tövsiyə olunmur.

Preparatın tərkibində etanol vardır! Uzun müddət ərzində istifadə etmək tövsiyə olunmur.

Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri

Preparat trankvilizatorların, neyroleptiklərin, yuxugətircilərin, sedativ preparatların, analgetiklərin, spazmolitiklərin, ürək dərmanlarının və hipotenziv preparatların təsirini gücləndirə bilər; həmçinin, alkoqolun təsirini gücləndirir.

Neqativ komplekslərin əmələ gəlmə ehtimalını nəzərə alaraq, preparati, alkaloid tərkibli duzlarla birlikdə istifadə etmək tövsiyə olunmur.

Preparatın III sinif aritmialeyhinə preparatlarla və həmçinin sizapridlə birlikdə istifadəsi tövsiyə olunmur.

Preparat, ürək qlikozidlərinin effektlərini gücləndirir.

Digər dərman preparatlarının eyni zamanda istifadəsi barədə həkimi məlumatlandırmaq lazımdır.

Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi

Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi əks göstərişdir.

Nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsiri

Preparatdan istifadə etdikdə, nəqliyyat vasitələrini və ya digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarə etməkdən çəkinmək lazımdır.

İstifadə qaydası və dozası

Böyükərə “Trikardin ürək damcısı” preparatını sutkada 3 dəfə yeməkdən əvvəl 20-30 damcı daxilə təyin etmək lazımdır.

12 yaşdan yuxarı uşaqlara preparatı, həyatlarının hər 1 ilinə 1 damcı hesabı ilə, sutkada 3 dəfə yeməkdən əvvəl təyin etmək lazımdır.

Müalicə kursunun davametmə müddəti, patoloji prosesin xüsusiyyətini və ağırılıq dərəcəsini, xəstəliyin gedişinin xüsusiyyətlərini, preparata qarşı tolerantlığı və əldə olunan müalicə effektinin stabilliyini nəzərə alaraq, hər bir pasiyent üçün fərdi qaydada müəyyən olunur.

Uşaqlar

12 yaşa qədər uşaqlara təyin etmək olmaz.

Əlavə təsirləri

Ürək-damar sistemində baş verən pozğunluqlar: hipotensiya, ürək ritminin əhəmiyyətli dərəcədə

ləngiməsi.

Sinir sistemində baş verən pozğunluqlar: depressiya, emosional reaksiyaların tormozlanması, başgicəllənmə, yuxuya meyillilik.

Həzm sistemində baş verən pozğunluqlar: ürəkbulanma, qarın nahiyyəsində spastik ağrılar.

Allergik reaksiyalar: qızarma, səpgilər, qaşınma, dəri ödemi.

Ümumi pozğunluqlar: yorğunluq hissi, əqli və fiziki iş qabiliyyətinin aşağı düşməsi.

Hər hansı arzuolunmayan reaksiyalar meydana çıxdığı halda, həkimə müraciət etmək lazımdır.

Doza həddinin aşılması

Təvsiyə olunan dozaları əhəmiyyətli dərəcədə aşdıqda, aşağıdakı simptomlar müşahidə oluna bilər – baş ağrısı, başgicəllənmə, yuxuya meyillilik, bradikardiya, arterial təzyiqin aşağı düşməsi, ümumi zəiflik, qarın nahiyyəsində ağrı, ürəkbulanma, eşitmə və görmə itiliyinin aşağı düşməsi, ürək çırpinması hissi, psixi oyaniqlıq, hiperhəssaslıq təzahürləri; bu hallar meydana çıxdıqda, preparatin istifadəsinin dayandırılması və simptomatik müalicənin aparılması tələb olunur.

Buraxılış forması

50 ml, şüşə və ya plastik flakonda. 1 flakon içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya qablaşdırılır.

Saxlanma şəraiti

25° C-dən yuxarı olmayan temperaturda, orijinal qablaşdırırmada və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır.

Yararlılıq müddəti

4 il.

Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.

Aptekdən buraxılma şərti

Reseptsiz buraxılır.

İstehsalçı/Ərizəçi

“Ternofarm” MMC, Ukrayna.

Ünvan

Ukrayna, 46010, Ternopol şəh., Fabriçnaya küç., 4.

Tel.:/Faks: (0352) 521-444, www.ternopharm.com.ua