



Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства КАМЕФЛЮ

Информация предназначена для специалистов

Название лекарственного средства.

Камефлю.

Общая характеристика.

Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость, которая находится под давлением в баллоне с клапаном дозирующего действия и при выходе из баллона образует дисперсную струю с характерным ароматным запахом.

Состав лекарственного средства.

Один баллон содержит:

Действующие вещества: хлорбутанола гемигидрат – 0,1 г, камфора рацемическая – 0,1 г, левоментол – 0,1 г.

Вспомогательные вещества: масло эвкалиптовое, изопропилмиристат, хладон 134а.

Форма выпуска.

Аэрозоль для местного применения.

Код классификации лекарственного средства.

Средства для лечения заболеваний гортани и глотки. Антисептические средства.

Код АТС – R02A A20.

Фармакологические свойства.

Фармакодинамика. Комбинированный препарат, оказывает местное противовоспалительное, антисептическое и умеренное «отвлекающее» действие.

Фармакокинетика. Камефлю предназначен для местного применения и создает терапевтическую концентрацию главным образом в очаге воспаления. Медленно и в незначительном количестве в системный кровоток всасываются только хлорбутанола гемигидрат и камфора рацемическая, которые обратимо связываются с белками крови. При биотрансформации образуются глюкурониды, в виде которых они выводятся почками.

Показания к применению.

В комплексной терапии воспалительных заболеваний носа и верхних дыхательных путей.

Способ применения и дозировка.

При заболеваниях верхних дыхательных путей аэрозоль необходимо распылять в полости носа (на глубине 0,5 см) или в полости рта путем нажатия на распылитель до упора. За



одно применение у взрослых осуществляют по 2-3 распыления. Частота применения составляет 3-4 раза в сутки. Курс лечения – 5-14 дней.

Перед применением снять защитный колпачок, выходное отверстие распылителя направить в полость носа на глубину 0,5 см или на пораженный участок горла и нажать на основание распылителя сверху вниз. При применении препарата в полостях носа и рта следует задержать дыхание, а баллон держать вертикально так, чтобы распылитель находился сверху; нельзя пользоваться баллоном в перевернутом состоянии. После применения препарата на распылитель надеть защитный колпачок.

Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого терапевтического эффекта и переносимости препарата. Препарат не следует применять дольше 2 недель.

Побочное действие.

Возможны аллергические (эритема, сыпь, зуд, крапивница, ангионевротический отек, анафилактический шок) и бронхоспастические реакции. У пациентов с повышенной чувствительностью возможно развитие ларингоспазма, бронхоспазма и апноэ.

Аллергические реакции на ментол могут сопровождаться развитием головной боли, брадикардии, мышечного тремора, атаксии, анафилактического шока и эритематозной кожной сыпи.

Иногда могут возникать реакции со стороны слизистых оболочек (ощущение жжения, сухости слизистой оболочки носоглотки, носа, появление язв в полости рта, отек в месте контакта).

При появлении побочных эффектов, в том числе не указанных в данной инструкции, необходимо прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

Противопоказания.

- возраст до 18 лет;
- лица с повышенной чувствительностью к компонентам препарата;
- эпилепсия, судороги в анамнезе (в том числе фебрильные), склонность к бронхоспазму, бронхиальная астма, коклюш.

Передозировка.

Признаки острого отравления при попадании внутрь: тошнота, рвота, боли в желудке. Пострадавшему следует немедленно обратиться к врачу. Меры помощи при передозировке: удаление препарата из желудка и кишечника (промывание желудка, использование солевых слабительных, клизма, применение кишечных адсорбентов - активированного угля), симптоматическое лечение.

В случае передозировки при местном применении возможно усиление симптомов побочного действия.

Вдыхание больших доз ментола может привести к развитию головокружения, спутанности сознания, мышечной слабости, тошноты и двоения в глазах.

Меры предосторожности.

Перед применением Камефлю ротовую полость нужно прополоскать теплой кипяченой водой. Перед применением препарата в полости носа следует очистить нос от слизи.

Баллон с препаратом не разбирать и не давать детям, предохранять от ударов.



Перед применением препарата лицам, склонным к аллергии, необходимо обязательно проконсультироваться с врачом.

Не допускать попадания лекарственного средства в глаза.

Если при применении лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

Применение в период беременности или кормления грудью.

В связи с отсутствием достаточных данных применение лекарственного средства беременным и кормящим женщинам не рекомендовано.

Дети.

В связи с отсутствием достаточных данных применять у детей не рекомендовано.

Влияние на способность управлять автомобилем и работать с механизмами.

Данные о влиянии на скорость реакций при управлении автотранспортом или другими механизмами отсутствуют.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами.

Информация о случаях взаимодействия отсутствует.

Не рекомендуется применять одновременно с другими средствами для местного применения в полости носа и рта.

Условия хранения и срок годности.

Хранить при температуре не выше 25 °С, в недоступном для детей месте. Предохранять от падений, ударов, воздействия солнечных лучей.

Срок годности – 2 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска. Без рецепта.

Упаковка. По 30 г в баллонах аэрозольных алюминиевых с клапанами дозирующего действия. Каждый баллон с распылительной насадкой, защитным колпачком и листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Информация о производителе (заявителе).

ООО «Микрофарм», 61013, Украина, г. Харьков, ул. Шевченко, 20,
телефон: +38 (057) 714-24-22.