

УТВЕРЖДЕНА
Приказом председателя
Комитета Фармации
Министерства здравоохранения
Республики Казахстан
от «05» 12 2018 г.
№ N018459

Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства

Оксолиновая мазь

Торговое название

Оксолиновая мазь

Международное непатентованное название

Нет

Лекарственная форма

Мазь назальная 2,5 мг/г, 10 г

Состав

1 г препарата *содержит*

активное вещество - оксолин 2,5 мг

вспомогательные вещества: масло вазелиновое (минеральное), парафин
белый мягкий

Описание

Мазь от белого до светло-желтого цвета, однородная. При хранении допускается появление розового оттенка.

Фармакотерапевтическая группа

Дерматология. Антибиотики и химиотерапевтические препараты для дерматологического применения. Противомикробные препараты. Химиотерапевтические препараты для местного применения. Противовирусные препараты.

Код АТХ D06BB

Фармакологические свойства

Фармакокинетика

При нанесении на слизистую оболочку всасывается до 20 % препарата. В организме не кумулирует и выводится в основном почками в течение суток.

Фармакодинамика

Механизм противовирусной активности оксолина обусловлен как его непосредственным воздействием на интенсивность вирусной репродукции, так и опосредованным действием через клетки хозяина – путем угнетения синтеза РНК (рибонуклеиновой кислоты) в инфицированных клетках, что препятствует размножению вирусов.

Оказывает выраженное ингибирующее действие на репродукцию вирусов гриппа, *Herpes zoster*, аденовирусов; особенно активен в отношении вируса гриппа А.

Показания к применению

- для профилактики гриппа
- для лечения вирусных ринитов

Способ применения и дозы

Назально.

Для профилактики гриппа: ежедневно 2-3 раза в день смазывают слизистую оболочку носа в период подъема и максимального развития эпидемической вспышки гриппа (на протяжении 25 дней) или при контакте с больным гриппом.

Лечение вирусного ринита: слизистую оболочку носа смазывают мазью 2-3 раза в день в течение 3-4 дней.

Побочные действия

Быстропроходящее чувство жжения слизистой оболочки носа, ринорея.

Противопоказания

- индивидуальная непереносимость препарата и его компонентов.

Лекарственные взаимодействия

Не выявлено

Особые указания

Беременность и период лактации

Применение препарата в периоды беременности и лактации возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Применение в детском возрасте до двух лет с осторожностью

Особенности влияния лекарственного препарата на способность управлять автомобилем и потенциально опасными механизмами

Препарат не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами.

Передозировка

Данных нет.

Форма выпуска и упаковка

По 10 г препарата в тубах алюминиевых. По 1 тубе вместе с инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках помещают в пачку из картона.

Условия хранения

Хранить при температуре от 2 °С до 8 °С.
Хранить в недоступном для детей месте!

Срок хранения

2 года
Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта

Производитель

ООО "Тернофарм"
Украина, г. Тернополь,
ул. Фабричная, 4;
тел./факс: +38 (0352) 521-444
www.ternopharm.com.ua

Держатель регистрационного удостоверения

ООО "Тернофарм" Украина

Наименование, адрес и контактные данные (телефон, факс, электронная почта) организации, на территории Республики Казахстан, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств от потребителей

ООО "Тернофарм"
Украина, г. Тернополь, ул. Фабричная, 4;
тел./факс: +38 (0352) 521-444
Сот. телефон: 87470126972
Адрес электронной почты: ternopharm@ternopharm.com.ua

Наименование, адрес и контактные данные (телефон, факс, электронная почта) организации, на территории Республики Казахстан, ответственной за пострегистрационное наблюдение за безопасностью лекарственного средства

ООО "Тернофарм"
Украина, г. Тернополь, ул. Фабричная, 4;
тел./факс: +38 (0352) 521-444
Сот. телефон: 87470126972
Адрес электронной почты: ternopharm@ternopharm.com.ua